Mes expériences sont d'accord avec les faits enregistrés en pédiatrie. Les cas de scorbut infantile sont rares, surtout en France. Cependant, on élève aux laits conservés un nombre considérable d'enfants qui supportent facilement le régime et prospèrent convenablement. Si tous ces laits étaient entièrement dépourvus de facteur C, le scorbut infantile ne serait pas une rareté.

J'insiste, en terminant, sur le point suivant. Pour utiliser les laits conservés avec sécurité dans tous les cas, même chez les débiles et les atrophiques pour lesquels leur richesse habituelle et leur digestibilité sont si précieuses, il suffit d'administrer régulièrement des sucres de fruits frais (orange, raisin). Il suffirait de généraliser l'emploi de ces sucres, de les considérer comme des satellites normaux de tout lait conservé ou même de tout lait bouilli, pour voir diminuer considérablement, sinon disparaître complètement, les cas de scorbut infantile.

CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DE LA MYCOLOGIE DU « KAJMAK »

(Deuxième Mémoire)

Par M. le Professeur Dr LOUIS GUTSCHY

Directeur du Laboratoire de bactériologie à la Faculté d'agronomie de l'Université
à Zagreb (Yougoslavie)

Autres microbes acido-présurigènes

Outre les bacilles du Kajmak VI, on trouve dans le Kajmak encore d'autres microbes du groupe des microbes acido-présurigènes. Tous ces microbes montrent les qualités caractéristiques des microbes acido-présurigènes, mais leurs fonctions les faisant ressembler avec le bacille VI, nous serons brefs dans leur description. Nous nous bornerons à leurs qualités particulières.

A. Le bacille de Kajmak VIII.

Ce bacille se présente comme un court bâtonnet immobile, d'une longueur de 4-5 μ , paraissant droit, mais souvent aussi quelque peu courbe. Une formation de spores n'a pas été observée. Les bacilles provenant de vieilles cultures montrent souvent un aspect granuleux. Le bacille est anaérobie facultatif. Une végétation aérobie comme chez le bacille VI, n'a pas été observée. Il prend le Gram. On a obtenu les meilleures cultures sur un milieu à l'extrait de malt (d'après MAKRI-NOFF) de la composition suivante :

250 gr. de malt d'orge ont été chauffés dans un litre d'eau pendant une heure à une température de 60° C., on filtre, on complète à 1 litre et on ajoute :

Sucre de canne	1.0 %
K ² H PO ⁴	0.1 %
Mg SO ⁴	0.05 %
Craie	2.00 %
Agar	2.00 %

D'autres milieux de culture ont été employés : *Le petit-lait avec peptone 1 ‰ - 2 ‰, sucre 1.5 ‰ et craie 2 ‰ - 3 ‰, le petit-lait de Cohendy, du lait stérile.*

La culture de gélatine et d'agar en piqûre montre une croissance en profondeur avec liquéfaction de la gélatine sous la forme de stries; la culture est fort chétive.

Optimum vers 35-37° C. Dans un bouillon d'extrait d'orge semblable à celui qui a servi pour le Kajmak VI (voir p. 262) on a trouvé les produits suivants :

1. Acide formique,	4. Acide lactique,
2. Quelque peu d'acide valérianique,	5. Alcool,
3. Acide acétique,	6. Acide succinique.

Réaction dans le lait. — Notre bacille fait coaguler le lait à 37° C. en trois jours. Cette coagulation a parfaitement le même aspect que nous sommes habitués à observer avec la coagulation du lait par le présure, par opposition à la coagulation provoquée par un acide. Le petit-lait est clair, presque incolore; le coagulum est blanc et dense. Après quelque temps cependant, le coagulum commence à se décolorer, il devient jaune, le petit-lait se trouble; bref, la peptonisation de la caséine coagulée s'accomplit doucement. Au bout de quelques jours la production d'acide dans le lait est typique et parfaitement caractéristique sous tous les rapports. Au bout de 6 jours, l'acidité monte à son maximum de 86° Thörner, pour s'abaisser ensuite lentement, assurément par suite de la consommation de l'acide par le bacille lui-même ou par suite de la neutralisation avec NH_3 ou autres produits basiques. Le lait coagule déjà avec 38° Thörner, soit avec un degré d'acidité beaucoup plus bas que celui qu'exige ordinairement la coagulation produite par un acide seul (environ 85° Thörner).

La réaction de notre bacille envers les composants séparés du lait est visible par le tableau suivant :

TABLEAU I

Dissolution des composés protéiques par le bacille du Kajmak VIII au bout de 30 jours à une température de 37° C. pour 100 ccm³ de lait.

	Azote total G-N	Azote soluble L-N	Azote aminé Z-N	Azote ammo- niacal A-N
Contrôle	0.4634	0.0478	0.0287	0.0058
Bac. du Kajmak VIII sans craie		0.2009	0.0377	0.0106
Bac. du Kajmak VIII avec de la craie ...		0.3060	0.0785	0.0126

Dans le pourcentage du contenu d'azote total ont été trouvés :

TABLEAU II

	Quantités trouvées			Quantités effectivement produites		
	L-N	Z-N	A-N	L-N	Z-N	A-N
Contrôle	10.32	0.62	1.26			
B. VIII sans craie	43.36	8.13	2.28	33.04	7.51	1.02
B. VIII avec de la craie.	66.05	16.94	2.73	55.73	16.32	1.47

TABLEAU III

Fermentation du lactose au bout de 26 jours à 37° C.

	Date	Degré d'acidité (Thörner)	Lactose dans 100 ccm ³ de lait	Sucre	
				fermenté	non fermenté
Contrôle	24-V	17°	4.122 gr.	—	—
Culture de lait avec B. VIII	18-VI	46°	1.248 gr.	69.73 %	30.27 %

En raison de toutes les qualités biochimiques de notre bacille, sa production d'acide, la coagulation et l'aspect du coagulum, la nature des produits de la réaction, son activité hydrolytique sur les protéines, nous sommes en état de dire qu'il s'agit dans notre cas d'un bacille lactique du groupe des microbes acido-présurigènes (d'après GORINI).

Sur la nature de l'enzyme des microbes acido-présurigènes. —

Il est d'un grand intérêt de déterminer avec précision la question de la nature de l'enzyme des microbes acido-présurigènes. Tandis que BOEKHOUT et Otto de VRIES (1) sont d'avis qu'il s'agissait d'un enzyme de nature peptique, ORLA JENSEN et C. GORINI émettent l'opinion qu'il s'agit d'une enzyme tryptique. J'ai essayé de trouver une réponse à cette question en employant une titration « en étapes » par le formol ainsi qu'elle a été recommandée par HENRIQUES et SÖRENSEN (2) et par HENRIQUES et GJALDBACK (3).

Plusieurs fioles de lait stérilisé ont été ensemencées avec le bacille du Kajmak VIII.

(1) BOEKHOUT W. et Otto de VRIES : *Centralbl. f. Bacteriologie II Abt.* 1901.

(2) *Zeitschrift für physiologische Chemie*, 63, 27, 1909.

(3) *Ibid.* 75, 363, 1911.

M'étant persuadé d'avance de la pureté de la culture, le sérum sécrété par la coagulation a été filtré et exactement neutralisé vis-à-vis de l'azolythmine. Ayant d'abord constaté la quantité d'azote totale, j'ai pris 20 cm³ de ce sérum neutralisé et j'y ai ajouté 0.5 cm³ d'une dissolution de phénolphthaléine (à 0,5 %) comme indicateur. Puis la dissolution ainsi préparée a été titrée alors avec une dissolution de n/5 NaOH jusqu'à une teinte à peine perceptible (I. Première étape), puis jusqu'à une teinte vive de couleur rouge (II. Deuxième étape) et plus tard, après l'adjonction de formol neutralisé jusqu'à la teinte rouge à peine perceptible (III. Troisième étape), et enfin jusqu'à la teinte rouge vive (IV. Quatrième étape) du contrôle.

Exemple : Le petit-lait de l'épreuve du contrôle contient dans 20 cm³ de liquide 93 mg. N. Conservé dans un thermostat à une température de 37°, la première titration a été exécutée au bout de 6 jours.

Il a été consommé :

1° Jusqu'à la teinte rouge à peine perceptible	1.90 cm ³ n/5 Na OH
Première étape	1.90 cm ³ n/5 Na OH
2° Jusqu'à la teinte rouge vif.....	0.40 cm ³ n/5 Na OH
Deuxième étape	2.30 cm ³ n/5 Na OH
3° Après addition de formol neutralisé jusqu'à la teinte rouge à peine perceptible encore	1.20 cm ³ n/5 Na OH
Troisième étape	3.50 cm ³ n/5 Na OH
4° Et jusqu'à la teinte de couleur vive	0.40 cm ³ n/5 Na OH
Quatrième étape	0.40 cm ³ n/5 Na OH
Contrôle au début	0.40 cm ³ n/5 Na OH
Contrôle à la quatrième étape.....	3.50 cm ³ n/5 Na OH
Proportion : $\frac{\text{Première étape}}{\text{Contrôle de la quatrième étape}} = \frac{1.90}{3.50} = 1/1,83$	
Contrôle du lait	2,80 cm ³ n/5 Na OH
	2,40 cm ³ n/5 Na OH
	0,40 cm ³ n/5 Na OH

TABLEAU IV

Titration au formol par étapes avec bacille du Kajmak VIII

LAIT SANS CRAIE

	Sur 93 mg. d'azote totale ont été consommés				cm ³ N/5 Na OH	1 : (4-K)
	1	2	3	4	contrôle	
Au bout de 6 j. à 37°...	1.9	2.3	3,5	3.8	0.40	1 : 1,83
» » 21 » » ..	2.0	2.4	4.3	4.6	0.70	1 : 1,95
» » 30 » » ..	2.3 ⁽¹⁾	3.1	4.9	5.7	0.25	1 : 2,36
» » 45 » » ..	2.6 ⁽²⁾	3.3	9.2	9.6	0.40	1 : 3,53
» » 80 » » ..	2.4	3.0	10.7	11.20	0.25	1 : 4,56

(1) Dans 100 cm ³ sont contenus en azote aminé.	0.0377 gr.	} c'est-à-dire 8,1 % de l'azote total.
Dans 100 cm ³ sont contenus en azote ammoniacal.....	0.0105 gr.	
(2) Dans 100 cm ³ sont contenus en azote aminé.	0.1038 gr.	} c'est-à-dire 22,3 % de l'azote total.
Dans 100 cm ³ sont contenus en azote ammoniacal	0.0710 gr.	

TABLEAU V
Titration au formol par étapes
LAIT AVEC DE LA CRAIE

	Sur 93 mg. d'azote totale ont été consommés				cm ³ N/5 Na OH	1 : (4—K)
	1	2	3	4	contrôle	
Au bout de 6 jours ...	1.3	1.60	2.30	2.50	0.3	1 : 1.68
» » 21 » ...	1.5	1.85	3.25	3.65	0.7	1 : 1.96
» » 45 » ...	1.9	2.30	7.80	8.20	0.4	1 : 4.10

Une comparaison des dernières colonnes de ces deux tableaux démontre que la proportion 1 : (4 ÷ K) n'est pas restée invariable, comme c'est généralement le cas avec la digestion pepsique, mais qu'elle est en train de s'abaisser définitivement. Dans le lait additionné de craie, cette proportion est quelque peu plus élevée au bout de 45 jours que dans le lait sans craie.

Les recherches avec des acides — aminés purs et d'autres polypeptides, — ainsi que celles d'autres auteurs, portent à conclure que par la digestion pepsique ne sont formés que des polypeptides et que la proportion de 1 : (÷ K) reste invariable ; par opposition, la digestion trypsique produit des acides aminés en grandes quantités. Et, en effet, j'ai aussi réussi à prouver l'augmentation en quantité des acides aminés. (Voir tableau IV et V.)

Cette réaction vérifie aussi la théorie de HENRIQUES et GJALDBACK, d'après laquelle les acides-amminés tirent leur origine de décomposition de polypeptides simples, l'union amidée CO — NH est, au préalable, émolisée : — C (OH) = N —.

Nous pouvons donc conclure de cette détermination que l'enzyme du bacille VIII et d'autres microbes acido-présurigènes n'est pas de nature pepsique (BOCKHOUT, DE VRIES), mais de nature trypsique. (GORINI, JENSEN).

Par l'exemple donné ci-dessus, l'utilité pratique de la méthode de titration au formol de SÖRENSEN n'est pas du tout épuisée. Ainsi par exemple, nous sommes en état par l'utilisation de cette méthode de poursuivre le cours de la décomposition enzymatique. En voici un exemple :

Il a été pris environ 1 litre de lait stérilisé. Celui-ci a étéensemencé avec une

émulsion du bacille VI le 7I-V-1923. 20 cm³ du lait de contrôle contenaient en G-N (azote total) 0.1358 gr. La première titration a été exécutée le 23-IV, c'est-à-dire au bout de 16 jours. Le résultat était le suivant :

a) *Première titration.*

Contrôle	2.3 cm ³ n/5 Na OH
	2.1 cm ³ n/5 H Cl
	0.2 cm ³ n/5 Na OH
Analyse. (20.0 cm ³ de lait)	8.7 cm ³ n/5 Na OH
	0.7 cm ³ n/5 H Cl
	8.0 cm ³ n/5 Na OH
Contrôle	0.2 cm ³ n/5 Na OH
Consommation	7.8 cm ³ n/5 Na OH

1 cm³ n/5 Na OH répond à 2.8 mg. N.

7.8 cm³ n/5 Na OH répondent à 21.84 mg. N, c'est-à-dire à 16.1 % de l'azote total.

b) *Deuxième titration.*

Contrôle	7.20 cm ³ n/5 Na OH
	6.10 cm ³ n/5 HCl
	1.10 cm ³ n/5 Na OH
Analyse (20,0 cm ³).	16.5 cm ³ n/5 Na OH
	14 cm ³ n/5 HCl
	15.10 cm ³ n/5 Na OH
Contrôle	1.10 cm ³ n/5 Na OH
Consommé	14.00 cm ³ n/5 Na OH

14.00 cm³ n/5 Na OH répondent à 3.920 mg. d'azote c'est-à-dire . 28.8 % de l'azote total.

J'ai examiné alors par le même procédé de titration le lait de contrôle normal et j'ai trouvé que 20 cm³ de ce lait contiennent 10,08 mgr. d'azote, décelable par la titration au formol. Cela répond à 7,4 % de l'azote total. Il s'ensuit de cela que des combinaisons de peptides sont dégagées chez le bacille VI au cours des premiers 16 jours: 16,1 — 7,4 = 8,7 % de l'azote total, tandis que 18 jours plus tard, encore d'autres, c'est-à-dire 28,8 — 16,1 = 12,7 % de l'azote total en combinaisons peptides sont libérées.

B. *Micrococcus* du Kajmak XIV.

Au commencement, j'ai fait mention que parmi les micro-organismes du Kajmak, nous avons aussi rencontré des représentants du groupe des coccacées. Je veux donner ici la description détaillée d'un coccus, que j'ai surnommé : *Micrococcus Kajmaki XIV*, et qui, selon ses qualités biochimiques, doit être compté apparemment aussi dans le groupe des microbes acido-présurigènes. Il doit donc être mentionné en relation avec les deux bacilles énumérés VI et VIII.

Ce coccus est rond, se présentant souvent sous la forme de diplococcus ; il mesure $1\mu 2$ à $1\mu 8$. Il est immobile, se colore bien avec toutes les couleurs d'aniline ordinaires. Il prend le Gram. Sur plaque de gélatine, se développent au bout de 2 à 3 jours des colonies rondes de couleur jaune clair, d'un diamètre de $1/4$ à $1/2$ mm. La surface est humide, brillante et quelque peu proéminente. Il fluidifie assez rapidement la gélatine. Dans la culture en piqure, il s'opère aussi au bout de quelques jours une fluidification en forme d'entonnoir. Sur l'agar incliné, il se forme une couche épaisse brillante de couleur jaune clair. Sur pomme de terre, la végétation est faible et donne un empâtement mucilagineux de couleur jaunâtre. Les meilleurs milieux de culture sont le lait, le petit-lait et le bouillon, d'après MAKRIKOFF.

Réaction dans le lait. — A la température de 20° C. le lait coagule en 3 jours ; à une température de 35 à 37° dans les 24 heures. La réaction est acide. Le coagulum est ferme et il exsude assez de petit-lait. Plus tard, le coagulum commence à se décomposer, à peptoniser ; il prend à cette occasion une teinte jaune foncée, se fluidifiant enfin tout à fait, de sorte qu'on peut le faire passer aisément par le filtre. Bien caractéristique pour notre coccus est la circonstance que la peptonisation s'opère plus vite et avec plus d'énergie à une température basse qu'à une température élevée. Le lait coagule avec 52° Thörner (0 gr. 468 d'acide lactique) ; l'acidité monte doucement pour arriver au bout de 3 jours à une température de 37° C. à 88° Thörner, après quoi elle commence à baisser de nouveau.

En examinant les produits de fermentation formés par l'activité du coccus dans le lait, nous trouvons, outre la peptone, les acides suivants : acide lactique, acide succinique, acide butyrique, acide acétique, acide formique, alcool et quelque peu d'ammoniaque. La décomposition de la caséine s'opère d'après l'exemple suivant :

TABLEAU VI

Dans 100 cm³ de lait sont trouvés en gr. (après 8 mois).

Désignation	Température	Azote total G-N	Azote soluble L-N	Azote aminé Z-N	Azote ammoniaque A-N
Contrôle		0.466	0.072	0.003	indices
Sans craie	35°		0.268	0.039	0.005
Avec de la craie	35°		0.349	0.055	0.008
Sans craie	20°		0.296	0.040	0.002
Avec de la craie	20°		0.436	0.050	0.004

TABLEAU VII

Fermentation du lactose avec le Micrococcus XIV après 3 mois.

Désignation	Température	Lactose		Quantité du sucre fermenté en %	
		fermenté	non fermenté		
Sans craie	35°	3.73	0.52	12.30	contrôle :
Avec de la craie.....	35°	2.18	2.07	48.84	4.252 gr. de
Sans craie	20°	3.86	0.39	9.17	lactose dans
Avec de la craie.....	20°	3.43	0.82	12.29	100 cm ³ du lait

Il s'ensuit de ce tableau :

1° Que notre coccus peptonise le lait en formant des produits azotés solubles en quantités prédominantes, quelque peu d'acides-aminés et des traces d'ammoniaque. En même temps, il se forme des traces d'acide butyrique, d'acide acétique, d'acide valérianique, d'ammoniaque, etc.

Après la neutralisation des acides formés par la craie, la peptonisation devient plus intense. L'enzyme est d'un caractère trypsique et répond à l'enzyme du bacille VI et VIII.

2° Il s'ensuit du tableau VII encore que notre coccus décompose en même temps le lactose aux températures élevées plutôt qu'aux températures basses, en formant de l'acide lactique, peu d'autres acides volatils.

D'après tous les produits donnés par le coccus, nous sommes en état d'en tirer la conclusion qu'il s'agit dans le cas actuel d'un coccus peptonisant, du groupe des microbes acido-présurigènes de GORINI.

Je veux encore ajouter que notre coccus montre la plus grande ressemblance avec *Micrococcus casei liquefaciens* de FREUDENREICH (ou d'après O. JENSEN : *Tetracoccus liquefaciens*) et que sa présence dans le Kajmak est toujours affirmée.

Les Microbes du groupe des ferments lactiques vrais dans le Kajmak

J'ai réussi à extraire du Kajmak deux représentants du groupe des microbes lactiques vrais : a) Le *B. bulgaricus*, synonyme avec le *B. casei* : de FREUDENREICH et b) le *B. caucasicum*, synonyme avec le *B. casei* α et δ de FREUDENREICH.

Pour ne pas allonger les descriptions en traitant la flore microbienne du Kajmak, je préfère renoncer à une description détaillée du bacille *bulgaricus*. En ce qui concerne son rapport immédiat avec le Kajmak, je veux seulement faire mention que ce micro-organisme représenté en grand nombre dans le Kajmak, pouvait être cultivé avec assez de facilité. Beaucoup plus intéressante est la circonstance que j'ai réussi deux fois à séparer de quelques essais sur du Kajmak de Macédoine

un bacille que j'ai pu déterminer non seulement comme appartenant au groupe des microbes lactiques véritables ou typiques, mais dans lequel j'ai pu reconnaître *B. caucasicum* véritable. Etant donné que les qualités de ce bacille sont peu connues chez nous, je me permets de faire suivre une courte description de ce bacille :

I. *Qualités morphologiques* : Bâtonnet court et mince de grandeur moyenne (2-3 μ long 0.8 à 1.2 μ large). La coloration au bleu de méthylène montre souvent des vacuoles à l'intérieur de la cellule ; prend le Gram.

II. *Qualités culturales* : Dans le bouillon ordinaire de viande avec peptone ou sur l'agar de viande avec peptone, pas de croissance. Sur pomme de terre, de même pas de croissance, ce qui démontre bien la qualité du bacille de ne pas réagir sur les polysaccharides. Par l'adjonction de sucre, l'organisme se met à croître sur agar de viande avec peptone et il donne des colonies caractéristiques. Celles-ci se présentent sur la plaque comme des colonies rondes ou ovales, à arête vive de couleur jaune brillante (parfois jaune foncée) d'aspect homogène ou granuleux.

Les meilleurs milieux de culture pour sa croissance sont : Le bouillon d'extrait de malt, mais il croît aussi bien sur l'agar d'après COHENDY, sur le petit-lait et sur agar avec lait. La croissance en piqûre est généralement meilleure que la croissance en strie (facultatif anaérobie). Optimum de la température : 32-34° C.

Après une courte période d'incubation de la durée de quelques heures, le lait coagule. Le lait coagulé ne montre pas de transformations visibles, ni gazéification, ni peptonisation ; il n'a ni de goût désagréable ni d'odeur repoussante. Le coagulum est dense, ferme et homogène. La formation d'acide est donnée dans le tableau suivant :

TABLEAU VIII

Formation d'acide du B. caucasicum à 37° (Thörner)

Contrôle	17° Thörner	Après 14 jours	178° Thörner
Après 12 heures	28° »	» 23 »	188° »
» 24 »	91° »	» 32 »	192° »
Après 3 jours	126° »	» 43 »	196° »
» 4 »	133° »	» 53 »	203° »
» 5 »	140° »	» 60 »	200° »
» 7 »	170° »	» 70 »	200° »

Comme on le voit nettement dans ce tableau, la formation d'acide croît vite après une incubation de 8 heures à 37°, pour atteindre son maximum au bout de 23 jours. Puis elle continue d'augmenter lentement jusqu'au 53^e jour pour rester alors quelque temps au même niveau. La formation d'acide par notre bacille est donc beaucoup plus élevée que celle du bacille de LEICHMANN.

III. *Qualités biochimiques du B. caucasicum* : Comme milieu de culture pour cette détermination, on se sert du bouillon d'extrait d'orge de 15 % en y ajoutant les substances salines suivantes :

K ² HPO ⁴	0.05 %
Mg SO ⁴	0.05 %
(NH ⁴) Mg PO ⁴	1.50 %
Peptone manganée	0.10 %

POUR TOUTES LES

Industries du Lait

La célèbre Marque
Française

INSTALLATIONS COMPLÈTES

Avec les appareils les plus modernes étudiés scientifiquement et pratiquement donnant le **maximum de rendement avec le minimum de frais.**

Beurseries
 Fromageries
 Pasteurisation
 Stérilisation
 Homogénéisation
 Condenseries
 Caséineries
 Lactoseries
 Farine Lactée
 Acide Lactique
 Margarineries
 Vinaigre de lait

8 GRANDS PRIX

LIEGE - MILAN
LONDRES
SARAGOSSE
BRUXELLES
BUENOS - AIRES
TURIN - GAND

HORS CONCOURS

Membre du jury

LYON 1914

Plus de 800

Homogénéisateurs

GAULIN

fontionnement

dans

les

plus importantes

Laiteries

du

monde

La Machine Initiale

30 ANNÉES D'EXPÉRIENCE dans les Installations laitières mettent notre clientèle à l'abri de tous les aléas que l'on rencontre dans les installations faites par des Maisons insuffisamment expérimentées, car ainsi que le dit le vieux proverbe :

**« C'est en forgeant...
que l'on devient forgeron »**

Anciens Etablissements A. GAULIN

BREIL & MARTEL, Successeurs

Société en nom collectif au Capital de 1.200.000 francs

19-21 et 23, rue Lasso, PARIS (XII^e)

HERMETICO'S

14-16, BOULEVARD BARBÈS - PARIS (XII^e)

Téléphone Nord 70-57

Bouchage SOUS LE VIDE de tous récipients

Hermélicité et Sécurité absolues

**PROCÉDÉS NOUVEAUX DE STÉRILISATION DU LAIT EN VASES CLOS
SANS AUTOCLAVE**

Cette stérilisation opérée sous le vide avec agitation violente, permet par des moyens simples, économiques et pratiques l'obtention d'un lait

SANS TRACES DE CARAMELISATION

quoique rigoureusement stérile.

Les procédés HERMETICO'S s'imposent

Pour éviter l'effet, supprimez-en la cause

Peut-être pouvez-vous craindre... Peut-être avez-vous constaté...

La Contamination du Lait

APRÈS SON PASSAGE AU RÉFRIGÉRANT

L'action néfaste d'un air vicié en est la cause

SUPPRIMEZ CETTE CAUSE

en employant le

Réfrigérant

Capillaire

“Lawrence”

A PANNEAUX AMOVIBLES

BIRON & LIÈGE, Ingénieurs-Constructeurs
93, 95, 97, rue du Chevalier-Français

R. C. 14578

LILLE

Tél. 12-51

Usines Alfred MELOTTE

REMICOURT (Belgique)

R. C. Lyon A. 20699

Ecrémeuses à moteur

pour

Laiteries et Fromageries

Débit horaire : 1.200 litres

Effectue à la perfection
l'écémage du lait entier
et le dégraissage du sérum

Pouvoir dégraisser incomparable

Demande peu de force : 3/4 HP.

Peut facilement être action-
née à bras pour travailler
quantité réduite de lait

ÉCRÉMEUSES A BRAS

de 60 à 600 litres à l'heure, à bol suspendu

Les véritables Ecrémeuses MELOTTE, de Remicourt, sont classées premières sur tous les marchés importants du monde par leur puissance d'écémage incomparable, leur fonctionnement léger et facile et leur longue durée

Ne pas confondre les véritables Ecrémeuses MELOTTE avec les écémuses SYSTÈME MELOTTE et autres imitations

BUREAU CENTRAL ET DÉPÔT :

Alfred MELOTTE

15, boulevard de Courgues, 15

à AULNAY-SOUS-BOIS (S.-et-O.)

BUREAUX ET DÉPÔT POUR LE SUD-EST :

Alfred MELOTTE

3, rue Victor-Hugo, 3

à LYON - VILLEURBANNE (Rhône)

NOUVEAUTÉ 192

L'excellence dans la simplicité par
les Écrémeuses à Moteur M^{le} 1926

ALFA-LAVAL

Aucune autre écrémeuse n'a pu atteindre la puissance de séparation de nos modèles nouveaux.

Demandez-nous le bulletin des essais officiels effectués à la Station d'Industrie Laitière de Surgères.

MODÈLES 2.000, 2.500 et 3.000 LITRES

tous offerts en deux types aux mêmes conditions
soit avec **COUSSINETS ORDINAIRES**

(40 années de sécurité)

soit avec **ROULEMENTS A BILLES**
entièrement protégés, simples et sûrs.

NOTRE MAGNIFIQUE CATALOGUE
VOUS PARVIENDRA SUR DEMANDE

Les Appareils de Laiterie, Beurrerie, Fromagerie

ALFA-LAVAL

sont les mieux conçus et les plus soigneusement exécutés

La Société Alfa-Laval ne craint aucun parallèle, aucune comparaison ; adressez-vous à elle en toute confiance. Soumettez-lui vos idées, elle fera pour vous gratuitement toutes les études qui vous intéressent ; elle se déplacera pour examiner vos projets et s'entendre avec vous.

La Société Alfa-Laval reste pour tous ses clients un collaborateur attentif et dévoué.

SOCIÉTÉ ALFA-LAVAL

Construction et Installation
d'Appareils de Laiterie

Société Anonyme au Capital de 3.000.000 de francs

10, rue Charles-V

PARIS (IV^e)

B. Causasicum.

B. Presam. Casei Gorini.

Peptone Chapoteau	0.20 %
Lactose	3.00 %
Craie	3.00 %

a) Réaction du *B. caucasicum* envers les hydrates de carbone et envers les alcools.

Pour arriver à ce but, le lactose dans le bouillon de culture a été remplacé par des hydrates de carbone variés (à 3 %). L'analyse a été faite 12 jours après l'ensemencement. Comme critérium pour la réaction du micro-organisme envers les hydrates de carbone, ont servi :

1° Sa croissance et sa multiplication déterminées par l'ensemencement avec la même anse de platine sur 3 plaques d'agar.

2° La quantité d'acide produite.

TABLEAU IX

	Multiplication	Quantité d'acide (en degré Thörner)
Contrôle	0	5°
Amidon	++ (1)	6.3°
Inuline	0	2.5°
Lactose	++++	126.2°
Sucre de canne	+++	12.8°
Glucose	+++	166.0°
Lévulose	+++	139.0°
Arabinose	0	30°
Gomme arabique	0	5°

(1) +	0-1000 colonies	+++	2000-3000 colonies
++	1000-2000 colonies	++++	3000-4000 colonies

TABLEAU X

Alcools (en dose de 0,5 %)

Désignation	Multiplication	Formation d'acide (Thörner)
Contrôle	0	
Alcool éthylique	0	
Glycérine	0	6° 5
Mannite	+++	36° 0

Il résulte de ce tableau IX que les fonctions physiologiques du *B. caucasicum* se manifestent le mieux sur les hydrates de carbone suivants : glucose, lactose et lévulose. Notre micro-organisme montre une réaction absolument négative envers les hydrates de carbone à 5 atomes de C et envers l'inuline. Bien intéressante est encore la circonstance que quelques hydrates de carbone, comme par exemple le sucre de canne et l'amidon, servent fort bien de milieu de culture en ce qui concerne la multiplication, mais qu'ils sont sous les autres rapports sans influence quelconque sur le microorganisme.

En ce qui concerne la réaction envers les alcools (tableau X), notre bacille ne montre une réaction positive qu'envers le mannite. Avec la glycérine, on a eu une faible formation d'acide, mais aucune multiplication.

b) *La réaction du B. caucasicum envers les sources variées d'azote.*

Les expériences ont été faites dans le même milieu de culture énuméré ci-dessus, à la seule différence qu'il a été employé un bouillon d'extrait d'orge de 8 % au lieu de celui de 15 %. En y ajoutant 3 % de sucre et les substances salines ordinaires sans peptone, on est arrivé par ce moyen à rendre négatives les épreuves de contrôle. Des composés azotés particuliers ont été ajoutés en quantités de 0.5 %. Les dosages ont été effectués 10 jours après l'ensemencement. Les résultats ont été les suivants :

TABLEAU XI

Désignation	Multiplication des microbes	Degré d'acidité après Thörner	Sucre	Dissolution des protéines
Contrôle	»	8°	3 %	
Albumine	++	102°	0.3 %	3/4
Caséine	++	70°	1.4 %	1/4
Peptone	+++	136°	0	
Asparagine	+	15°	2.5 %	
Gélatine	+	105°	traces	

Il résulte de ce tableau que la peptone est le meilleur aliment azoté. Parmi les substances protéiques non dissoutes, la caséine et l'albumine montrent les conditions les plus favorables. Elles coagulent sous l'action de l'acidité qui se développe, puis plus tard, elles se dissolvent partiellement par hydrolyse.

IV. *Réaction du B. caucasicum envers le lait.* — 300 cm³ de lait stérilisé ont été ensemencés avec un bouillon de culture du *B. caucasicum* et mis à l'étuve à une température de 35° C. Au bout d'un mois à peu près, ce lait et le témoin ont été analysés. Les résultats ont été les suivants :

TABLEAU XII

Désignation	Acidité	Quantité de la caséine	G-N	Azote de caséine	L-N	Z-N	A-N	Sucre (Bertrand)
Témoin	26°T	2.504 %	0.466 %	0.392 %	0.051 %	0.030 %	indices	4.36 %
Lait et <i>B. caucasicum</i>	156°T	1.776 %	—	0.276 %	0.082 %	0.046 %	faibles	2.91 %

On voit que le *B. caucasicum*, comme le *B. lactis acidii* Leichmann dissout la caséine à peu près dans la proportion de 32-33 %. Le sucre subit une oxydation énergétique. La graisse ne montre pas de changements remarquables.

V. *Détermination des produits de l'activité vitale du Bacterium caucasicum.*

Les expériences ont été faite, avec du bouillon d'extrait de malt avec 3 % de sucre. Après que la fermentation du sucre est complète, une analyse a été faite.

Je me suis servi dans ce but de la méthode de NENCKI et DUCLAUX. Avant tout, on a déterminé la quantité produite d'acide lactique en mesurant la chaux dissoute. On a trouvé que la quantité trouvée d'acide lactique correspond parfaitement à la quantité calculée. Puis on a distillé pour chercher les produits volatils. On n'a obtenu ni alcool ni éther et ni acides volatils.

Toutes ces recherches montrent que le *B. caucasicum* ne forme pas d'autres produits que de l'acide lactique.

ANALYSE DU LAIT CONDENSÉ SUCRÉ

par F. RICHARD.

L'analyse de ce produit présente de sérieuses difficultés en raison de sa grande viscosité, et le chimiste, s'il n'est pas spécialisé en la matière, se trouve en présence d'un problème embarrassant. S'il consulte les auteurs, il s'aperçoit qu'ils sont d'une rare sobriété de renseignements sur les procédés à employer pour ce cas spécial. Après de nombreux tâtonnements, je me suis arrêté à la méthode que je vais décrire, et je crois bien faire en indiquant les moindres détails des opérations qui doivent conduire à d'indiscutables résultats.

En général, on vous demande de déterminer la densité à 15° C., le pourcentage en eau, matière grasse, et sucre cristallisable (saccharose). Il est rare qu'on soit appelé à doser le lactose, la matière azotée et la matière minérale.

Etant donné le peu de fluidité du L. C. (lait condensé), il est impossible d'en prendre directement le poids spécifique, soit au densimètre, soit à la balance de Westphal ; pour la même raison, le dosage de l'eau devient une opération incertaine, car, dès qu'on veut pousser un peu la température au delà de 100° C., l'extrait se caramélise avec la plus grande facilité. Pour réussir l'analyse, il faut avant tout, préparer des solutions aqueuses soigneusement dosées ; il est recommandable de faire toutes les pesées du L. C. dès que la boîte est ouverte, car il arrive souvent que la surface de certains échantillons se couvre d'une croûte dure au bout de quelque temps de contact avec l'air.

A l'ouverture de la boîte, on brasse bien la masse au moyen d'une forte baguette de verre, surtout si l'on affine à du L. C. non écrémé, et immédiatement on procède aux :

Opérations préliminaires : 1° Peser 50 gr. de L. C. dans une capsule tarée, y ajouter environ 20 c.c. d'eau distillée et agiter prudemment avec une petite baguette de verre pour délayer la masse, on verse le mélange dans un petit entonnoir placé sur un ballon jaugé de 100 c.c., on rince capsule et entonnoir par petites portions d'eau, on amène le mélange à la température de 15° C., et complète le volume à 100 c.c., on secoue bien de temps en temps, pour avoir un mélange parfaitement homogène. C'est la *solution A*.