lait ne contient pas d'acide lactique, peu après il en renferme toujours, ce qui rend logique la détermination de l'acidité du lait en acide lactique.

Sous cette influence, l'acidité de titration du lait augmente, ainsi que son acidité réelle, avec le nombre des microbes qu'il contient.

Cette action est plus ou moins rapide suivant la température à laquelle est soumise le lait. Très lente au voisinage de 0° centigrade, elle augmente d'intensité et de rapidité jusqu'à un optimum de 37°, température qui, nous le savons, est la plus favorable à la culture des ferments lactiques ordinaires.

(A suivre.)

L'INFLUENCE DE LA CASÉINE EN SUSPENSION, LORS DU BARATTAGE DE LA CRÈME ACIDIFIÉE

par W. van DAM et B. J. HOLWERDA

Les recherches dont les données sont communiquées dans ce travail, furent d'abord faites dans le but suivant. Selon la théorie de RAHN (1) sur le processus de barattage, la modification de la teneur en caséine, lors de barattage de crème acidifiée, n'a aucune influence, ou certainement bien moins d'influence que celle de la teneur en albuminoïdes *en solution*. Cette dernière modification a de l'influence, notamment sur la formation d'écume et sur la tension superficielle. En premier lieu fut examinée l'influence de la quantité de la caséine en suspension; mais les résultats obtenus étaient tellement inattendus, que nous avons décidé de continuer nos recherches sur ce point, bien que de cette façon, nous nous écartions, dans certaine mesure, du but primitif de nos recherches. Cette décision fut d'ailleurs encore influencée par d'autres circonstances imprévues.

Pour observer l'influence sur l'évolution du processus du barattage, de quantités diverses de caséine, il fallait des expériences parallèles dans lesquelles, seules, les quantités de caséine étaient différentes, tandis que tous les autres facteurs: teneur en matière grasse, degré d'acidité, conditions de la matière grasse, etc. étaient identiques. Pour réaliser ces conditions, il fut procédé de la façon suivante. Du lait fut centrifugé de façon à obtenir de la crème contenant plus de 40 % de matière grasse et du lait écrémé à teneur en matière grasse aussi réduite que possible. Les deux produits ainsi obtenus furent pasteurisés, par le maintien pendant 25 minutes à la température de 65° C. et après réfrigération, la crème fut placée dans de la glace pendant 22 heures au moins, tandis que le lait écrémé fut acidifié par l'addition d'une culture pure.

(1) Forschungen auf dem Gebiete der Milchwirtschaft und des Molkereiwesens. I, 309 (1921).

Le lait écrémé acidifié servit à diluer la crème, jusqu'à ce qu'elle eût une teneur en matière grasse déterminée, et à préparer par filtration à travers un linge du sérum servant à diluer une seconde quantité de crème jusqu'à ce qu'elle eût une teneur en matière grasse égale à celle de la première. Dans certaines expériences, une troisième quantité de crème fut additionnée d'une bouillie de caséine d'où il résultait une crème très épaisse, par suite de la teneur très élevée en caséine. Il est évident, qu'à la suite des observations antérieurement faites, toutes les précautions furent prises pour maintenir la matière grasse à une température inférieure à celle du barattage. Comme la caséine forme facilement des combinaisons avec les alcalis, il ne put être question de titrage, lors de l'ajustement du degré d'acidité. Il fallait, ou bien titrer le sérum obtenu après élimination de la caséine par filtration, ou bien déterminer le pH. Nous avons eu recours à la détermination potentiométrique du pH. Seulement dans les premières expériences d'orientation, nous avons eu recours à la méthode colorimétrique pour constater si les trois préparations avaient le même P_H . Généralement, il n'y eut pas de difficultés pour obtenir trois préparations, à teneurs en caséine différentes, qui avaient, pratiquement, le même degré d'acidité, le jour après la dilution de la crème, soit au moyen de lait écrémé, soit au moyen de sérum, soit au moyen de la bouillie de caséine ou *lait épaissi*. A l'exception des premières expériences, il fut toujours baratté dans les petites barattes d'expériences, placées dans un thermostat, une quantité de 2,5 litres de crème « diluée ». Un litre de crème à teneur très élevée de matière grasse fut dilué de 1 litre $\frac{1}{2}$, soit de lait écrémé, soit de sérum, soit d'un mélange de lait écrémé et de sérum, ou de lait écrémé et de lait épaissi.

Si donc, en tête d'une colonne, on trouve la mention : crème + $\frac{2}{3}$ sérum + $\frac{1}{3}$ lait acidifié, cela veut dire que 1 litre de crème à teneur très élevée de matière grasse a été dilué de 1 litre de sérum et de $\frac{1}{2}$ litre de lait écrémé acidifié. Le tableau I renseigne sur les données de quelques expériences préliminaires. A titre d'exemple, toutes les autres données y sont également fournies.

Si nous limitons notre examen de ces expériences d'orientation, aux données concernant la teneur en matière grasse du babeurre et la durée du barattage, nous constatons qu'apparemment dans tous les cas, la teneur en matière grasse est en raison inverse de la quantité de caséine en suspension dans la crème. Dans les trois premières expériences fut faite la comparaison de crème diluée dans de grandes proportions avec du sérum, de crème diluée dans les mêmes proportions avec du lait écrémé acidifié de même origine que la crème. Dans les trois cas, le babeurre, provenant de la « crème-sérum », avait une teneur en matière grasse notablement plus élevée. Dans les trois expériences suivantes,

les dilutions furent faites, dans un cas, au moyen de lait écrémé acidifié dans l'autre, au moyen de bouillie de caséine, obtenue par la filtration, sur une toile, de lait écrémé acidifié. Dans ces expériences encore, la teneur en matière grasse du babeurre était notablement moins élevée pour la crème contenant la plus grande quantité de caséine en suspension, c'est-à-dire pour celle provenant du mélange de crème et de bouillie de caséine. Dans les expériences des 2 et 10 juin, la teneur en constituants albuminoïdes des mélanges barattés fut déterminée; le mélange de bouillie de caséine et de crème contenait environ 1 % de plus de caséine (1) que celui de crème et de lait écrémé acidifié. Dans les expériences de comparaison de « crème-sérum » et de « crème-lait écrémé acidifié » l'écart doit avoir été encore plus considérable.

Les durées du barattage des quatre premières expériences paraissent avoir été assez peu influencées par la plus ou moins grande consistance des mélanges barattés. Dans l'expérience du 19 mai, où un des mélanges était constitué par 1 l. de crème et 1,5 l. de sérum, mélange de grande fluidité, les durées du barattage étaient de 43,5 et 42 minutes. Il importe cependant de signaler que ces durées ne présentaient pas une exactitude suffisante, pour le motif suivant. Au cours d'expériences ultérieures, il fut observé que, lors de barattage d'une crème identique, dans les deux petites barattes, il y avait un écart plus considérable qu'antérieurement; au début, insignifiant, il était arrivé à représenter 5 % de la durée de base (2). Cette circonstance n'avait apparemment aucune importance pour la teneur en matière grasse, mais il n'en est plus ainsi quand il s'agit de déterminer correctement la durée du barattage. Si donc, il ne fut pas possible de tirer des conclusions certaines d'un nombre réduit d'expériences, le nombre relativement élevé de données fournit cependant des indications de valeur. Les données du tableau I indiquent déjà que les écarts entre les durées de barattage des quatre premières expériences ne peuvent être *considérables*. Dans les expériences du 2 et 10 juin, le mouvement moins intense a nettement donné lieu à une prolongation de la durée du barattage. Nous n'avons pu déterminer pour quel motif la même chose ne s'est pas présentée dans l'expérience du 26 mai. Dans cette même expérience, le degré d'acidité (titré) ne put être expliqué.

Les tableaux II et III fournissent les données d'expériences similaires, faites sur une plus grande échelle, dans ce sens, qu'une même crème était diluée de six différentes façons, ainsi que l'indiquent les

(1) Les données de l'expérience du 10 juin, ne présentaient pas une très grande netteté, à la suite de formation d'écume, au cours des distillations, mais les pourcentages réels ne peuvent s'écarter que très peu des pourcentages renseignés.

(2) Probablement, ce défaut est survenu après une réparation de l'appareil qui dut être faite; cependant, le défaut de l'appareil, auquel il fallait remédier, ne pouvait apparemment être cause de l'inconvénient constaté.

TABLEAU I

	10 mai		14 mai		19 mai		26 mai		2 juin		10 juin	
	Crème + lait acidifié	Crème + sérum	Crème + lait acidifié	Crème + sérum	Crème + lait acidifié	Crème + sérum	Crème + lait acidifié	Crème + lait acidifié épaissi	Crème + lait acidifié	Crème + lait acidifié épaissi	Crème + lait acidifié	Crème + lait acidifié épaissi
Quantité de crème ...	1125 cc.	1125 cc.	1375 cc.	1375 cc.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.
Quantité de substance y additionnée	1000 cc.	1000 cc.	1125 cc.	1125 cc.	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5
Total du mélange....	2125 cc.	2125 cc.	2500 cc.	2500 cc.	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5
Teneur en mat. grasse du mélange	20 %	20 %	19.5 %	19.5 %	17.5 %	17.5 %	18.2 %	18.2 %	17.3 %	17.3 %	16.6 %	16.6 %
Degré d'acidité du mé- lange	69.5	48	56	39	62	42	56	56 (?)	59	67	59	68
Température de matu- ration	12.5°C.	12.5°C.	13°C.	13°C.	14°C.	14°C.	13°C.	13°C.	14°C.	14°C.	15°C.	15°C.
Durée de la maturation	11 heures	11 heures	21 heures	21 heures	22 heures	22 heures	23 heures	23 heures	23 heures	23 heures	23 heures	23 heures
Température de barat- tage	13.5°C.	13.5°C.	13°C.	13°C.	15°C.	15°C.	15°C.	15°C.	15°C.	15°C.	15°C.	15°C.
Durée du barattage..	22 min.	25 min.	32 min.	30 min.	43 min. 5	42 min.	42 min.	44 min.	59 min.	71 min.	50 min.	75 min.
Température finale...	15°C.	15°C.	14.5°C.	14.5°C.	12.5°C.							
Teneur en matière grasse du babeurre .	0.50 %	1.00 %	0.40 %	1.00 %	0.38 %	0.80 %	0.40 %	0.35 %	0.40 %	0.33 %	0.35 %	0.25 %

en-têtes des colonnes 2-7. La quantité de caséine en suspension dans chacun des mélanges était croissante, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les quantités d'acide au 1/10 utilisées pour la détermination selon Kjeldahl, de la teneur en constituants albuminoïdes de 5 cc. de crème. Ces tableaux donnent encore le pH des filtrats des crèmes déterminé au moment du barattage ; les quantités d'acide au 1/100 N, utilisées pour la détermination, selon Kjeldahl, de la teneur en constituants albuminoïdes de 1 gr. de beurre, la teneur en eau du beurre et enfin le degré d'acidité titrée de la crème.

TABLEAU II.

	17 et 18 juin					
	Crème + sérum	Crème + $\frac{2}{3}$ sérum + $\frac{1}{3}$ lait acidifié	Crème + $\frac{1}{3}$ sérum + $\frac{2}{3}$ lait acidifié	Crème + lait acidifié	Crème + $\frac{1}{2}$ lait acidifié + $\frac{1}{2}$ lait acidifié épaissi	Crème + lait aci- difié épaissi
Crème à 43,75 %	1 l.—	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.
Volume total de sub- stance additionnée .	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5	1 l. 5
Volume baratté	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5	2 l. 5
Teneur en matière grasse du mélange baratté.....	17.50 %	17.50 %	17.50 %	17.50 %	17.50 %	17.50 %
Température de matu- ration.....	14.5°C.	14.5°C.	14.5°C.	14.5°C.	14.5°C.	14.5°C.
Durée de la maturation	21 heures	21 heures	22 heures	22 heures	23 heures	23 heures
Température initiale de barattage.....	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.
Durée du barattage..	48 min.	46 min.	44 min.	47 min.	49 min.	70 min.
Température finale de barattage.....	14.2°C.	14.3°C.	14.2°C.	14.2°C.	14.15°C.	14.3°C.
Teneur en matière grasse du Beurre .	0.85 %	0.65 %	0.50 %	0.45 %	0.35 %	0.32 %
Kjeldahl par 5 cc. ...	8.7 cc.	12.1 cc	15.3 cc.	18.55 cc.	22.8 cc.	27.15 cc.
cc. de HCl à 1/100 par gr. de beurre	2.92 cc.	3.25 cc.	4.35 cc.	5.20 cc.	7.22 cc.	10.71 cc
% d'eau du beurre ..	12.0	12.0	11.5	10.8	12.3	14.5
Degré d'acidité titrée .	52.0	59.0	66.5	72.5	80.0	90.0
pH de la crème	4.48	4.48	4.50	4.47	4.50	4.50

TABLEAU III.

	26 et 27 juin					
	Crème + sérum	Crème + $\frac{2}{3}$ sérum + $\frac{1}{3}$ lait acidifié	Crème + $\frac{1}{3}$ sérum + $\frac{2}{3}$ lait acidifié	Crème + lait acidifié	Crème + $\frac{1}{2}$ lait acidifié épaissi	Crème + lait acidifié épaissi
Crème à 41,0 %	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.	1 l.
Volume total de substance additionnée ..	1.5 l.	1.5 l.	1.5 l.	1.5 l.	1.5 l.	1.5 l.
Volume total du mélange baratté	2,5 l.	2.5 l.	2,5 l.	2.5 l.	2,5 l.	2.5 l.
Teneur en matière grasse du mélange baratté	16.4 %	16.4 %	16.4 %	16.4 %	16.4 %	16.4 %
Température de maturation	13.5°C.	13.5°C.	13.5°C.	13.5°C.	13.5°C.	13.5°C.
Durée de la maturation	21 heures	21 heures	22 heures	22 heures	24 heures	24 heures
Température initiale de barattage	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.	14°C.
Durée du barattage ..	55 $\frac{1}{2}$ min.	56 min.	54 min.	51 $\frac{1}{2}$ min?	61 min.	90 min.
Température finale de barattage	14.2°C.	14.2°C.	14.15°C.	14.2°C.	14.2°C.	14.25°C
Teneur en matière grasse de babeurre ..	0.60 %	0.50 %	0.45 %	0.40 %	0.35% +	0.35 %—
Kjedahl par 5 cc. ...	8.65 cc.	11.9 cc.	15.25 cc.	18.15 cc.	24.45 cc.	29.4 cc.
cc. de HCl. à 1/100 par gr. de beurre	3.13 cc.	3.26 cc.	4.15 cc.	4.87 cc.	6.95 cc.	8.75 cc.
% d'eau du beurre ..	12.8	13.3	12.2	11.1	12.5	12.6
Degré d'acidité titrée	52.5	58.5	64.0	74.0	80.5	86.5
pH de la crème	4.58	—	—	4.57	—	4.58

Les données de ces tableaux montrent qu'au moment du barattage, les pH des crèmes étaient à peu près égaux. De plus, il apparaît du nombre de c.c d'acide à 1/10 N saturés dans le procédé de Kjeldahl que l'écart entre les teneurs en caséine de la première et de la dernière expérience du tableau II était de 3,3 % (1) et de 3,7 % (1) pour celles du tableau III. Ici encore, il est évident que la teneur en matière grasse du babeurre est inversement proportionnelle à la quantité de caséine en suspension dans le mélange baratté. Le tracé établi selon les chiffres obtenus représente une courbe relativement régulière.

(1) Evidemment ces chiffres ne sont pas absolument exacts ; il n'a pas été tenu compte de l'adsorption, sans aucun doute très prononcée des constituants albuminoïdes du sérum et à la caséine éliminée par filtration.

Nos données concernant la durée du barattage des expériences préliminaires sont confirmées par les données des tableaux II et III

pour l'établissement desquels il fut tenu compte des observations antérieurement faites. Les écarts entre les durées du barattage sont moins considérables que ceux qu'on aurait pu prévoir, en présence de la fluidité très différente des mélanges barattés ; seulement, pour la concentration la plus grande de caséine, on constate une prolongation bien nette de la durée du barattage. En concordance avec les prévisions les beurres présentaient des teneurs plus considérables en constituants albuminoïdes, lorsque le mélange baratté contenait une plus grande quantité de caséine en suspension.

Dans les deux cas, le beurre, préparé du mélange « crème + lait acidifié », avait la teneur en eau la moins élevée ; il est possible qu'on ne puisse impliquer que le hasard, à ce sujet, car les données obtenues ne présentent aucune régularité. L'avant-dernière colonne montre l'accroissement du degré d'acidité titré des mélanges qui ont un pH identique ; évidemment cette circonstance est due à l'augmentation de la teneur en caséine.

Nous avons fait encore nombre d'expériences pour confirmer le fait que la baisse de la teneur en caséine de la crème provoque une hausse de la teneur en matière grasse du babeurre. Dans chacune d'elles, la durée du barattage fut contrôlée, afin de disposer de plus de données ce qui permit d'attacher plus de valeur aux moyennes des chiffres constatés. Les données de ces expériences sont établies dans le tableau IV, dans lequel cependant les détails ont été omis, afin de ne pas rendre cette communication trop longue.

De ces données, il ressort que le barattage de crème diluée de sérum donna du babeurre dont la teneur en matière grasse dépassait en moyenne 0,23 % celle du babeurre obtenu par le barattage d'un mélange de crème et de lait acidifié. Une seule fois, le 24 juillet 1924, les teneurs en matière grasse furent égales ; les deux mélanges donnèrent 0,50 %. L'écart 0,23 % peut être considéré comme tant soit peu forcé, puisque dans 5 cas seulement, un mélange de crème et de sérum fut baratté, ce qui donna toujours un babeurre à teneur très élevée en matière grasse. Dans onze expériences fut faite la comparaison de crème mélangée de

TABLEAU IV.

INFLUENCE DE LA TENEUR EN CASÉINE EN SUSPENSION SUR LA TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DU BABEURRE ET LA DURÉE DU BARATTAGE

Dates	Crème + $\frac{2}{3}$ sérum + $\frac{1}{3}$ lait acidifié		Crème + lait acidifié		Crème + lait acidifié épaissi	
	Durée	Teneur en matière grasse du babeurre	Durée	Teneur en matière grasse du babeurre	Durée	Teneur en matière grasse du babeurre
10 mai 1924. (x)	25'	1.00 %	22'	0.50 %	—	—
14 » (x)	30'	1.00 %	32'	0.40 %	—	—
19 » (x)	42'	0.80 %	43 $\frac{1}{2}$ '	0.38 %	—	—
26 »	—	—	42'	0.40 %	44'	0.35 %
2 juin	—	—	59'	0.40 %	71'	0.33 %
10 »	—	—	50'	0.35 %	75'	0.25 %
16 »	46'	0.65 %	47'	0.45 %	70'	0.32 %
25 »	56'	0.50 %	51 $\frac{1}{2}$ '	0.40 %	90'	0.35 %
1 ^{er} juillet	50'	0.55 %	56'	0.35 %	—	—
9 »	49'	0.50 %	46'	0.35 %	—	—
23 »	48'	0.50 %	55'	0.50 %	—	—
29 »	55'	0.50 %	66'	0.35 %	—	—
5 Août	60'	0.55 %	60'	0.38 %	—	—
22 juin 1925.	48'	0.60 %	56'	0.30+ %	—	—
30 »	40'	0.50 %	40'	0.30 %	—	—
28 juillet	67'	0.35 %	80'	0.30 %	—	—
17 août	72'	0.40 %	82'	0.30+ %	—	—
7 septembre	78'	0.65 %	79'	0.40 %	—	—
14 septembre (o)	82'	0.65 %	99'	0.45 %	75'	0.40 %
3 novembre (o)	35'	0.55 %	35'	0.45 %	40'	0.40 %
10 »	50 $\frac{1}{2}$ '	0.50 %	53'	0.30+ %	—	—
8 décembre	42'	0.35 %	44'	0.20 %	—	—
12 janvier	51'	0.45 %	52'	0.30 %	35'	0.30 %
19 »	49 $\frac{1}{2}$ '	0.40 %	53 $\frac{1}{2}$ '	0.30 %	53'	0.35—%
3 août	42'	0.60 %	51'	0.58 %	—	—
9 »	45'	1.00 %	55 $\frac{1}{2}$ '	0.62 %	—	—
16 »	49 $\frac{1}{2}$ '	0.64 %	63'	0.48 %	—	—
23 » (x)	50 $\frac{1}{2}$ '	1.14 %	66 $\frac{1}{2}$ '	0.56 %	103 $\frac{1}{2}$ '	0.49 %
6 septembre (x)	56'	1.12 %	71'	0.55 %	91'	0.45 %
Moyennes (26)	51'	0.63 %	56'	0.40 %	—	—
Moyennes (11)	—	—	57'	0.42 %	68'	0.36 %

(x) A ces dates, un litre de crème à teneur élevée en matière grasse ne fut pas dilué au moyen de 1 l. de sérum et de $\frac{1}{2}$ l. de lait acidifié, ainsi qu'il est dit en tête de la 2^e colonne, mais au moyen de 1 $\frac{1}{2}$ l. de sérum.

(o) A ces dates, un litre de crème à teneur élevée en matière grasse ne fut pas dilué au moyen de bouillie de caséine, mais au moyen de 1 l. de cette bouillie et $\frac{1}{2}$ l. de lait acidifié.

lait acidifié épaissi (bouillie de caséine) et de crème diluée de lait acidifié ordinaire. Pour le premier mélange, la teneur en matière grasse du babeurre était en moyenne moins élevée de 0,06 % que celle du babeurre du second mélange. Le 19 janvier 1926, il y eut exception ; le babeurre du mélange le plus riche contenait 0,35 % de matière grasse, celui du mélange le moins riche, 0,30 % de matière grasse (1). Le 24 juillet 1924 et le 12 janvier 1926, les teneurs en matière grasse furent égales, ce qui, en somme, constitue encore une exception. Nous ne sommes pas parvenus à trouver une explication.

Généralement la durée du barattage était moins longue pour les crèmes les plus fluides ; les durées moyennes étaient de 51 minutes et de 56 minutes, pour les 26 cas examinés, et de 57 minutes et 68 minutes pour les 11 cas, dans lesquels de la crème ordinaire fut comparée à un mélange de crème et de bouillie de caséine. La détermination des durées de barattage fournit certaines données, jusqu'ici inexplicables. Ainsi le 14 septembre 1925 et le 12 janvier 1926, la durée du barattage de la crème la plus consistante était notablement moins longue que celle du barattage de la crème ordinaire, à l'encontre de ce qui se produisait généralement. Dans ces cas, il y eut donc intervention de facteurs influençant la durée du barattage que nous ne connaissons pas. De ce qui précède, nous ne nous autorisons donc de déduire que cette seule conclusion :

Dans des conditions similaires de barattage et de préparation de la crème, la teneur en matière grasse du babeurre obtenu sera inversement proportionnelle à la quantité de caséine en suspension dans la crème barattée.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE

1^o LES LIVRES

PEYTAVIN (P.) — **Le buffle en Cochinchine.** *Th. Doct. Vét.* Lyon, 1927.

La population bubaline et bovine est très peu dense en Cochinchine ; on compte environ 350.000 buffles et 120.000 bœufs, soit à peu près 6 buffles et 2 bœufs par km². Le buffle est le plus apprécié, pouvant seul travailler utilement dans la vase et la boue. Mais la Cochinchine n'est pas un pays d'élevage proprement dit ; elle importe chaque année du Cambodge et du Laos 30.000 à 40.000 sujets nécessaires pour ses travaux agricoles.

(1) Il importe de signaler, que la température de barattage des deux mélanges était de 13° C. Aucune constatation anormale ne fut faite, lors de barattage des mêmes mélanges à une température de 16° 5 C., les teneurs en matière grasse du babeurre étaient alors : 0,45 %, crème épaisse, 0,50 %, crème fluide.