rature de 75° C. et a duré de 15 à 16 secondes. Le temps total pour le passage à travers les trois parties de l'appareil a été de deux minutes et demie environ. Le traitement n'a altéré ni l'odeur, ni le goût naturels du lait.

La montée de la crème du lait « stassanisé » a été un peu inférieure à celle du même lait avant le traitement, bien qu'elle ait été beaucoup supérieure à celle du lait pasteurisé à haute température.

L'influence du traitement sur la faculté du lait de se coaguler par la présure a été si minime qu'elle n'a pratiquement pas porté préjudice au caillage.

L'écémage parfait au moyen d'une écrémeuse à main ou mécanique se fait aussi aisément avec le lait stassanisé qu'avec le lait cru.

Gardé dans des conditions identiques, le lait stassanisé se conserve plus longtemps que le lait cru et le lait pasteurisé à haute température.

La composition chimique du lait a été très peu influencée par le traitement ; environ 8 % seulement des protéines dissoutes sont transformées.

La teneur du lait en vitamines A et B n'a pas été influencée par le traitement.

Le traitement a détruit de 99,4 à 99,9 % de la flore bactérienne ordinaire du lait.

Le traitement a également tué tous les colibacilles, la bactérie de l'avortement épizootique et le bacille de la tuberculose.

La consommation en vapeur, en force et en eau par ce procédé a été inférieure à celle des procédés de la pasteurisation ordinaires.

L'appareil STASSANO demande un nettoyage soigneux, mais ce dernier n'est point trop difficile ; il peut être effectué dans la pratique ordinaire, et la construction nouvelle de l'appareil montrée dans la figure 2 offrira probablement des avantages à cet égard.

(Traduction de M. C. WOLF.)

LA MÉTHODE SYNTHÉTIQUE DANS L'ÉTUDE DU LAIT.

LE LAIT AU POINT DE VUE COLLOIDAL.

RECHERCHES SUR LE MÉCANISME DE L'ACTION DE LA PRÉSURE

par Ch. PORCHER,

Docteur ès sciences physiques

(Suite)

Notre première hypothèse sur le rôle des phosphates insolubles de calcium dans l'emprésurage. — Comme nous le

(257) Ch. PORCHER. — Les divers complexes caséinate de chaux + phosphate de chaux et leur façon de se comporter vis-à-vis de la présure. *C. R. Ac. Sc.* 1925, **180**, 1534.

disions dans un travail antérieur *les caractéristiques objectives de la coagulation : rapidité de celle-ci et consistance du coagulum, sont sous l'étroite dépendance de la quantité de phosphate de calcium du complexe.*

Nous mettions au singulier le mot *phosphate* de calcium, car nous pensions alors que le phosphate tri-calcique jouait le rôle dominant dans la coagulation par la présure. Or, nous savons aujourd'hui que c'est au pluriel qu'il faut mettre ce mot. Nous croyions, il y a quelques années, que c'étaient les micelles de phosphate tricalcique, le seul que nous envisagions alors, qui entraînaient ceux de caséinate de calcium après l'empresurage.

« Le rôle de la présure, disions-nous, grâce à une action digérante extrêmement faible, est de diminuer la viscosité du milieu, ce qui tend à rendre plus mobiles les micelles de phosphate calcique auxquelles sont unies ceux du caséinate et à en faciliter la soudure ».

Cette interprétation d'ordre presque uniquement physique — nous disons presque, puisque nous ne voulions pas ignorer le rôle protéolytique du ferment-lab, — paraîtra tout imprégnée de l'enseignement qui découle des acquisitions sur la floculation des colloïdes, mais nous l'avons abandonnée sous la pression d'expériences qui ont suivi et pour mieux montrer jusqu'à quel point, en présence de faits dûment enregistrés et qui ne sauraient être contestés, notre esprit s'était laissé en quelque sorte dominer par des considérations colloïdales, nous ne manquerons pas dans certaines des expériences qui vont suivre d'insister sur l'interprétation nouvelle que nous donnons à nos recherches antérieures.

« Si un complexe, disions-nous, ne renferme que peu de phosphate de chaux, il ne coagulera pas par la présure. »

Ceci se conçoit aisément dès l'instant où nous faisons du phosphate de calcium l'élément essentiel de la coagulation ; il en faut un nombre suffisant de micelles pour déterminer cette dernière.

« D'un autre côté, si la charge du complexe en phosphate alcalino-terreux est considérable, il n'est plus besoin de l'intervention de la présure ; le seul chauffage à 40° de ce complexe, qui préparé à froid, était stable à la température ordinaire, suffit pour provoquer la formation d'un coagulum. »

En effet, avec des complexes très fortement chargés en phosphate de calcium, provenant par conséquent de caséinates très calciques, complexes qui cependant étaient stables à la température ordinaire, nous obtenons, lorsque nous les portons au B.M. à 40°, *sans addition aucune de présure*, répétons-le, un coagulum. Alors que tout à l'heure, disions-nous toujours, il n'y avait pas suffisamment de micelles de phosphate de calcium pour entraîner la masse pondéralement beaucoup plus lourde des micelles du caséinate calcique, dans le second cas, nous avons en quelque sorte la saturation colloïdale du caséinate par le

phosphate, saturation stable aux températures ordinaires, instable aux températures élevées.

C'est que, sous l'empire des conceptions colloïdales, notamment de celles qui donnent à la notion de protection pleine valeur, nous avons pensé que si dans le complexe ordinaire préparé en partant d'un caséinate à 1100, le caséinate de calcium suffisait à protéger le phosphate de calcium, — et à ce moment nous ne pensions qu'au phosphate tricalcique —, il n'en pouvait être de même pour les complexes dont la charge phosphato-calciqque était considérable. Et devant l'instabilité d'un pareil système quand on le chauffe à 40°, nous en arrivions tout naturellement à la susdite notion de la saturation du caséinate de calcium par le phosphate de calcium colloïdal, laquelle, à l'inverse des saturations salines, était stable aux températures ordinaires, et instable aux températures élevées. En d'autres termes, il n'y avait plus assez de caséinate calciqque pour stabiliser la grande masse de phosphate de calcium qui se trouvait en sa présence.

Le bloc obtenu au B.M. à 40° avec des caséinates dont la charge phosphatique est considérable est assez mou, facile à disloquer si on l'agite un peu vivement et il laisse exsuder un sérum plutôt louche. Quoi qu'il en soit, ce bloc ressemble vraiment au gel labique ; c'est ce qui nous amenait à l'identifier avec lui et à conclure qu'entre le moment où un caillé se forme avec la charge minimum en phosphate de calcium, *mais avec l'aide de la présure*, et celui où on l'obtient *sans présure*, par suite d'une charge forte en phosphate de calcium, il y avait toute une gamme de situations.

En suivant la technique de HAMMARSTEN, c'est-à-dire en apportant l'acide phosphorique à un caséinate calciqque très alcalin, nous en étions arrivé aux mêmes résultats que BRIOT (102), LINDET (75) qui avaient obtenu la précipitation de toute la caséine du lait en chargeant celui-ci de phosphate de calcium par apports successifs de chlorure de calcium et de phosphate de sodium. Ainsi qu'on le sait, dans ces conditions, il se fait du phosphate de calcium et la concentration en est telle, disions-nous, que l'ensemble constitue un système très instable ; mais à l'encontre de la manière de faire de BRIOT, de LINDET, etc... nous avons pu éliminer du système le chlorure de sodium qui se forme par double décomposition entre le chlorure de calcium et le phosphate de sodium.

Etant donné que le phosphate de calcium est, en l'absence de tout colloïde, d'une très grande fragilité, nous pouvions supposer *a priori* que c'était justement son instabilité qui devait en faire l'agent de la précipitation du caséinate, celle-ci se déclanchant lorsque l'action protectrice du caséinate sur le phosphate de calcium ne s'exercerait plus.

Poursuivant notre pensée première dans toutes ses conséquences, nous pouvions dire que le pouvoir protecteur du caséinate de calcium

vis-à-vis du phosphate de calcium était donc assez limité, et nous retrouvons ici ce que nous avons dit plus haut lorsque nous avons rappelé les expériences de de TONI sur la formation du phosphate de calcium colloïdal en présence de différents colloïdes protecteurs. Il arrivait un moment où le phosphate de calcium, du fait de son abondance n'était plus protégé. En faisant jouer au phosphate tricalcique le rôle principal dans la coagulation du lait par la présure, qui ne devenait rien autre pour nous que la coagulation de son phosphate de calcium, nous disions, il y a quatre ans : « Pour obtenir la coagulation du caséinate de calcium par la présure, il faut le charger d'un sel insoluble susceptible de prendre l'aspect colloïdal et de former avec le caséinate un ensemble stable. »

Les acides polybasiques qu'on peut substituer à l'acide phosphorique. — Mais on peut substituer à l'acide phosphorique d'autres acides polybasiques dont les sels alcalino-terreux sont également susceptibles d'affecter l'état colloïdal. C'est le cas de l'acide *arsénique*, ce qui n'est pas fait pour nous surprendre étant donné son voisinage chimique immédiat avec l'acide phosphorique. Mais c'est aussi celui de l'acide *carbonique* sur lequel nous avons travaillé et qui a fait l'objet de recherches particulièrement intéressantes relevées plus loin.

Il apparaît qu'il est possible de réaliser un nombre assez grand de complexes variés qui réagiraient tous vis-à-vis de la présure. Leur formule serait du type général : *caséinate* (*Ca, Ba, Sr, Mg*) + *phosphates, arséniates ou carbonates... de Ca., Ba, Sr, Mg.*

Il importe pour observer leur coagulation par le lab de toujours viser avec soin l'obtention d'un *pH* terminal qui soit 7 ou aux environs de 7, et surtout dans la zone acide.

Notre seconde hypothèse : ce sont les sels calciques solubles qui tiennent sous leur dépendance le gel labique. — Après avoir fait jouer le rôle essentiel au phosphate insoluble de calcium, et plus spécialement au phosphate tricalcique, dans la coagulation du complexe par la présure, nous avons été amené à prendre le contre-pied de cette première proposition et à reconnaître que ce sont les sels solubles, au contraire, qui doivent être responsables de la formation du gel labique.

LA DIALYSE DU COMPLEXE. — Les expériences de dialyse du complexe sont tout à fait significatives.

On fait un complexe ordinaire à 1100 dont le *pH* = 6,91.

Caséine sèche : 6 grammes.

Eau de chaux à 1 gr. 16 : 191 cm³.

Acide phosphorique à 18 gr. par litre : 8 cm³.

On ajoute une goutte d'essence de moutarde.

On met à dialyser 50 cm³ de ce complexe dans un sac en collodion contre de l'eau distillée fixe, dont le volume est de 450 cm³

Les sacs en collodion étaient constitués de trois couches et le collodion résultait, selon la formule de DUCLAU, du mélange à volumes égaux de collodion pour filtre large et de collodion pour filtre plus serré.

L'expérience commence à 16 heures et l'on porte à la glacière.

A 18 heures, c'est-à-dire, deux heures après seulement, on fait des essais d'emprésurage.

TABLEAU LXXXII.

INFLUENCE DE LA DIALYSE DU COMPLEXE SUR L'EMPRÉSURAGE

Durée de la dialyse	Temps de prise
Complexe témoin	65 sec.
Complexe dialysé 2 heures	85 sec.
Complexe dialysé 6 heures	Pas de coagulation en bloc au bout de 5 min. $\frac{1}{2}$; on n'a qu'un léger épaissement de la liqueur avec une opacité porcelanique, et des petits flocons se collent aux parois.

Le lendemain, le pH de l'eau du dialysat est de 6,94, celui du complexe dialysé de 7,12.

La dialyse fait donc aller le complexe vers l'alcalinité, mais la valeur du pH n'est cependant pas telle qu'une coagulation dans les conditions habituelles ne pourrait pas avoir lieu, puisque le pH est bien en-deçà de la limite critique : 7,4-7,5 au-delà de laquelle la présure n'agit plus.

Le complexe témoin dilué dans les mêmes proportions que le complexe dialysé coagule par la présure.

Le lendemain matin à 8 heures, le complexe ne coagule plus par la présure, mais il coagule à nouveau si à 5 cm³ de ce complexe on ajoute 0 cm³ 02 de CaCl² N/1, ce qui correspond à 0 gr. 44 de CaCl² pour un litre (4/10 de molécule).

Il coagule également par addition de quelques gouttes d'un filtrat d'une liqueur obtenue en mettant en contact du phosphate tricalcique et du phosphate monocalcique, liqueur qui renferme un mélange de phosphates mono- et bi-calcique.

Ce complexe dialysé qui ne réagit plus vis-à-vis du lab, coagule de nouveau après barbotage de CO² pendant quelques minutes.

Ce qu'il faut relever de particulièrement intéressant dans ce dernier fait, c'est qu'il n'y a pas de nouvel apport calcique.

Lorsque nous avons vu le complexe inerte vis-à-vis de la présure coaguler à nouveau par l'addition de CaCl² ou d'une solution de phosphates mono- et bicalcique, nous versions dans la liqueur des ions Ca nouveaux. Avec CO², nous engendrons des ions H nouveaux qui vont solubiliser une partie de la chaux du complexe restant dans le dialyseur ; ils attaquent d'abord le phosphate tricalcique en faisant à ses dépens du phosphate bi- et certainement du phosphate mono-calcique.

Une seconde expérience analogue à la précédente a été effectuée. Après une dialyse de 48 heures, au bout desquelles le complexe restant ne coagule plus, nous avons dosé les cendres du complexe témoin et les cendres du complexe dialysé :

Cendres du complexe témoin : 2,25 gr. pour 1000 cm³

Cendres du complexe dialysé : 1,40 gr. pour 1000 cm³

Il a donc passé à travers le dialyseur des sels minéraux dont les cendres sont de 0 gr. 85.

Dans une même expérience, nous avons, au bout de 24 heures, remplacé les eaux de dialyse par un égal volume d'eau distillée.

Les premières eaux de dialyse nous ont donné 0,560 gr. de cendres et les deuxièmes 0,210 gr., ce qui fait, pour une dialyse de 48 heures, un total de 0,770 gr. Ce chiffre est voisin du précédent, et d'autant plus que nous devons faire remarquer que la concentration de 900 cm³ près d'un litre d'eau de dialyse, a été fatalement accompagnée de pertes.

Il était intéressant de doser également le phosphore des dialysats :

P²O⁵ du premier dialysat : 0,271 gr. pour 1000 de liqueur

P²O⁵ du deuxième dialysat : 0,080 gr. »

Total : 0,351 gr. »

La quantité de P²O⁵ apporté par la burette était de 0 gr. 52. Il en est donc dialysé les 2/3.

De ces expériences suggestives, il résulte que, *très rapidement, par dialyse, le complexe phosphatique qui coagule parfaitement par la présure perd sa faculté de coaguler.*

Il n'est pas besoin de réfléchir plus longuement pour que nous en tirions de la façon la plus nette la conséquence que *les phosphates insolubles qui n'ont pas traversé la membrane ne peuvent intervenir dans le phénomène de la coagulation.* Quoi dialyse, en effet, et assez vite pour impressionner l' emprésurage ? Ce ne peuvent être que des sels solubles. Or, ils existent et même avant que nous ayons pu nous rendre compte de leur nature et affirmer qu'il s'agissait de phosphates mono- et bicalcique, nous étions bien obligé d'avouer leur solubilité puisqu'en cristal-loïd esparfaits, ils ont très rapidement traversé la membrane du dialyseur.

Nous avons vu plus haut qu'en raison des masses de chaux, d'acide phosphorique qui réagissent lors de la formation du complexe pour donner des phosphates de calcium, il y avait un mélange de phosphates bi- et tri-calcique ; nous avons même admis qu'il se faisait aussi du monocalcique, mais en petite quantité, en raison du pH du dialysat. S'il devait s'en faire beaucoup, il est certain que, par sa forte acidité, ce sel réagirait sur le caséinate. Retenons par ailleurs que la solubilité du phosphate bicalcique n'est pas négligeable et l'on doit accepter que c'est ce sel qui, en compagnie de la faible quantité du phosphate monocalcique, a traversé la membrane.

Nous avons vu dans les pages précédentes que pour un complexe de pH donné, la quantité de chaux qui était unie à la caséine dans ce complexe était à peu près celle qui correspondait au caséinate libre de

même pH. Au fur et à mesure que l'on ajoute de l'acide phosphorique dans un complexe, on fait une plus grande quantité de phosphate ; c'est dire que, parallèlement, *on décalcifie les caséinates. Mais en même temps, on modifie les rapports entre les phosphates calciques*, en les faisant virer vers le mono-calcique, pour les pH acides, vers le tri-calcique, pour les pH alcalins.

LA MÉCANIQUE CHIMIQUE DES PHOSPHATES DE CALCIUM.

Nous sommes donc amené à examiner d'aussi près que possible quels sont les phosphates qui peuvent exister dans les complexes, mais pour y parvenir, nous devons opérer en l'absence de caséinate de calcium. Les masses que nous avons fait réagir ont toujours correspondu au taux ou à un taux voisin de celui qu'elles ont dans le lait.

Les relations entre les trois orthophosphates : mono-, bi- et tri-calcique sont assez incomplètement expliquées dans les ouvrages courants ou du moins, quand on les y trouve exposées, ils'agit toujours de solutions concentrées ou de masses importantes en présence.

Dans le lait, nous devons parler de solutions diluées, puisque le taux des phosphates de calcium par litre de lait, — nous laissons de côté les phosphates de magnésium dont la mécanique doit être semblable — oscille entre 1 et 2 grammes.

Pour l'étude de la mécanique chimique des phosphates de calcium au taux susdit, la détermination des pH nous donnera des résultats suggestifs.

Préparation du phosphate bi-calcique. — Avant d'aborder cette préparation, il est essentiel d'avoir un CaCl_2 tout à fait neutre, de même qu'un phosphate de sodium SÖRENSEN (47), ne renfermant, comme on le sait, qu'une molécule d'eau.

En faisant agir une solution de CaCl_2 sur une solution de $\text{PO}\cdot\text{Na}^2\text{H}$, molécule à molécule, la réaction se fait selon la formule :

Le mélange des deux liqueurs a été effectué à des températures différentes afin de pouvoir suivre la marche de la réaction et déterminer son sens. On a opéré successivement aux températures : 0°, 15°, 40°, 60°, 80° et 100°, et chaque fois, on a pris le pH correspondant. Les solutions de chacun des sels étaient 2 N/100, N étant rapporté à la molécule anhydre, ce qui nous amène à un taux de phosphate bicalcique anhydre par litre de 1 gr. 36. Les liqueurs ont été obtenues en laissant tomber goutte à goutte le CaCl_2 de la microburette sous l'agitateur électrique dans la solution de phosphate de sodium.

La solution de phosphate bicalcique obtenue dans la glace fondante est opalescente et renferme de toutes petites particules en suspension ; son pH = 6,77. Avec le temps, celles-ci semblent grossir légèrement et se déposent au fond du vase, la température étant maintenue à 0°. A la température ordinaire, les flocons sont plus gros ; pH = 6,68.

A 50° : flocons assez analogues à ceux qui précèdent : $pH = 5,87$.

A 80° : flocons très gros : $pH = 5,30$.

A 100° : flocons lourds : $pH = 5,06$.

Il y a donc une marche ascendante vers l'acidité au fur et à mesure qu'on élève la température, ce qui est tout à fait d'accord avec ce que l'on sait : c'est que lorsqu'on chauffe le phosphate bicalcique en solution dans l'eau, il se décompose graduellement en phosphate monocalcique et en phosphate tricalcique. Ce dernier, par son insolubilité totale n'agit pas sur le pH , mais c'est le phosphate monocalcique qui, fortement acide, influe sur cette valeur physique.

Examen microscopique du précipité. — Le précipité de phosphate bicalcique est cristallisé, celui de phosphate tricalcique est amorphe.

Au microscope, le phosphate bicalcique se présente sous la forme de grandes lamelles transparentes à angles aigus nageant au milieu de petites masses dont les formes sont plus difficiles à préciser. BARILLÉ, avec raison, a insisté sur l'aspect cristallisé du phosphate bicalcique et montré que l'état cristallin n'appartenait pas seulement au monocalcique.

Il était intéressant de noter au microscope l'influence du chauffage sur l'aspect du précipité cristallin de phosphate bicalcique.

Si l'on porte le phosphate bi-calcique au B.M. à 100° pendant 10 minutes, on voit que les lamelles plates à arêtes vives dont il est parlé ci-dessus se désagrègent ; elles perdent leur transparence, deviennent granuleuses, les angles s'arrondissent, bref, la forme cristalline disparaît, et il semble bien que cela réponde à une transformation du phosphate bi- en phosphate tri-calcique, entraînant nécessairement la formation de phosphate monocalcique, selon l'équation :

Les filtrats de toutes les liqueurs précédentes, à quelque température qu'ils aient été obtenus sont très limpides, mais *ils se troublent par une addition légère d'ammoniaque*. Le trouble ne se constate pour ainsi dire pas pour la liqueur préparée à 0°, mais il est déjà net pour la liqueur préparée à la température ordinaire, et de plus en plus au fur et à mesure qu'on élève la température. Il semble que dans la précipitation à 0°, la plus grande partie du phosphate qui se forme soit du bicalcique et que nous ayons par suite peu de monocalcique. Aussi, le trouble s'accroît-il au fur et à mesure que la proportion de monocalcique croît elle-même.

Nous avons recommencé l'expérience précédente, mais en faisant varier les conditions du chauffage.

En effet, dans la liqueur, nous avons un précipité de phosphate bicalcique qui s'est transformé en un mélange de tricalcique insoluble et de monocalcique soluble.

Il était intéressant de voir ce que l'on obtiendrait selon que l'on ferait porter l'action de la chaleur sur la liqueur totale ou sur le filtrat de cette liqueur.

On mélange 25 cm³ de solution de $CaCl^2$ à autant de solution de phosphate de sodium, à la température ordinaire. Le pH du filtrat = 6,68.

On porte la liqueur tout entière avec son précipité au B.M., à 100°. On sait

qu'il se fait un précipité plus lourd qui se rassemble, puis on jette sur un filtre ; pH du filtrat = 4,41.

On recommence l'opération, mais en portant au B.M. à 100° , seulement le filtrat obtenu à la température ordinaire. La liqueur se trouble et précipite, ce qui signifie que le phosphate bicalcique en solution s'est décomposé sous l'action de la chaleur en phosphate tricalcique insoluble et en phosphate monocalcique. En effet, on filtre à nouveau, et on obtient une liqueur limpide dont le $pH = 4,73$.

Que signifient ces résultats ?

Quand on opère sur la liqueur entière, le précipité bicalcique, ainsi que le phosphate bicalcique resté en solution se décomposent à l'ébullition en un monocalcique soluble et en tricalcique lourd, qui se rassemble.

Si on opère sur le filtrat obtenu avant de chauffer, ce n'est que le phosphate bicalcique dissous qui se décompose à l'ébullition en donnant du phosphate monocalcique et un précipité de tricalcique.

Comme la décomposition est moindre sur le filtrat que sur la masse totale, cela nous explique pourquoi le pH des liqueurs est un peu moins élevé avec le chauffage du filtrat seul obtenu à la température ordinaire qu'avec le chauffage de l'ensemble de la liqueur.

Nous avons réalisé également la formation des trois orthophosphates par addition *en quantités très exactement mesurées d'acide phosphorique et de chaux*. Il importe que les liqueurs soient titrées avec le plus grand soin.

Phosphate monocalcique. — Bien entendu, il n'y a pas de précipité. Le $pH = 4,10$.

Phosphate bicalcique. — Il y a un léger précipité. Le pH tant sur la totalité de la liqueur que sur le filtrat = 6,25 (a).

(a) Il y a une différence dans les pH selon que ce sel a été obtenu par double décomposition entre $Po^4Na^2H^2$ et $CaCl^2$ ou par addition de CaO à Po^4H^2 ; il est moins acide dans le premier cas que dans le deuxième.

Phosphate tricalcique. — La liqueur est alcaline à la phthaléine : $pH = 8,4$ par colorimétrie sur la liqueur entière ; sur le filtrat, $pH = 8,2$.

Mais on doit se demander *si par le mélange de la chaux et de l'acide phosphorique en quantités bien mesurées, il se fait uniquement les sels leur correspondant* ? Sans doute, est-ce le cas dans la préparation du phosphate mono-calcique, mais avec celle du bi- et du tri-, on doit aboutir à un équilibre résultant de la présence simultanée des trois phosphates, le phosphate visé dominant dans le mélange. En s'adressant aux phosphates mono- et bi-calcique purs Poulenc, nous obtenons pour des solutions à 1 pour 1000, avec le phosphate mono-calcique, un $pH = 3,3$; avec le phosphate bi-calcique, un $pH = 7,2$.

Action de la chaleur sur ces phosphates. — Le phosphate monocalcique limpide et les filtrats des bi- et tri-calciques sont portés au B.M. à 100° pendant 10 minutes environ.

La liqueur monocalcique ne change pas d'aspect ; elle reste limpide.

Les filtrats des liqueurs bi- et tri-calciques se troublent. Dans le filtrat du bicalcique, il se forme des flocons légers qui déposent, alors que le filtrat du tricalcique se trouble uniformément, mais il n'y a aucune tendance à la floculation.

Les pH se sont modifiés : celui du monocalcique n'a guère varié, puisqu'il est de 4,15 au lieu de 4,10, mais il n'en est pas de même du bicalcique. Le pH sur la totalité de la liqueur est de 5,21 ; sur le filtrat, il est de 5,55. Cette baisse notable du pH , originellement de 6,25, est due à la décomposition du phosphate bicalcique en mono- et en tri-calcique.

La liqueur du tricalcique dont le trouble est léger et uniforme vire également vers l'acidité. Le pH de la liqueur totale est de 6,60 ; celui du filtrat est de 6,30.

Action de l'ammoniaque. — Si l'on ajoute une goutte d'ammoniaque au phosphate monocalcique, on obtient un trouble très net et d'abondants petits flocons ; il se forme du phosphate tricalcique. Si l'on opère avec le filtrat bicalcique, on a un trouble faible et qui n'augmente pas sensiblement par l'addition de nouvelles gouttes d'ammoniaque. Une goutte de cette base dans le filtrat du tricalcique n'altère pas la limpidité de celui-ci. L'insolubilité du phosphate tricalcique explique qu'il n'en reste à peu près plus dans le filtrat, mais la solubilité non douteuse du phosphate bicalcique nous fait comprendre que par l'addition de l'ammoniaque sur le filtrat, on ait un trouble qui est dû à la formation de phosphate tricalcique.

ACTION DU CO^2 SUR LES PHOSPHATES CALCIQUES. — Nous avons vu antérieurement que lorsqu'on faisait barboter CO^2 dans des laits dits « paresseux », qui réagissent très mal vis-à-vis de la présure, on leur rendait la possibilité de donner un coagulum net avec ce ferment.

L'interprétation de ce barbotage est facile. En même temps qu'il apporte des ions H dans la liqueur, parce que l'anhydride carbonique en présence de l'eau donne de l'acide carbonique CO^3H^2 , nous solubilisons de la chaux, c'est-à-dire que nous déterminons la formation de nouveaux ions Ca solubles et H , circonstance tout à fait favorable au processus labique.

Aux dépens de quels sels calciques préexistants, l'acide carbonique crée-t-il des ions solubles sous forme de bicarbonate calcique ?

D'abord, aux dépens des phosphates calciques, les caséinates de calcium, de $pH < 7$, cédant moins facilement leurs ions Ca à l'acide carbonique qui se forme.

La thèse de BARILLÉ à laquelle nous avons emprunté au cours de ce travail est à consulter sur ce point. Voici ce que dit cet auteur :

« Si on fait agir CO^2 sur du phosphate bicalcique, ce sel se dissout en assez grande quantité. »

BARILLÉ admettait qu'il se formait un carbonato-phosphate de calcium, mais on peut tout aussi bien penser qu'il se forme un système relativement simple : phosphate mono-calcique + bicarbonate calcique ou plus compliqué : phosphates mono- et bi-calcique + bicarbonate calcique. L'apport de CO^2 venant à cesser, le système en question va perdre le gaz carbonique, puisque la tension que ce gaz y possède est plus grande que celle qu'il a dans l'atmosphère, et bien entendu, le

bicarbonate calcique va tout d'abord se transformer en carbonate. Le phosphate monocalcique en présence va réagir ensuite sur le carbonate pour redonner du phosphate bicalcique. On est donc revenu à l'état initial, et l'on a fermé le cycle des réactions chimiques.

Si on fait agir CO_2 , comme l'a fait BARILLÉ, sur le phosphate tricalcique, le CO_3H_2 s'empare d'une molécule de calcium pour donner du bicarbonate calcique soluble et transformer le tricalcique en bicalcique ; on arrive ainsi au système dont il vient d'être parlé. Il est possible de tout dissoudre le phosphate tricalcique pour peu que l'apport de CO_2 soit suffisant. Pour BARILLÉ, il se formerait du carbonato-phosphate de calcium à côté du bicarbonate calcique, c'est-à-dire, tout un système assez instable qui perd à l'air libre son CO_2 combiné et laisse déposer des cristaux bien définis de phosphate bicalcique.

Si l'on fait barboter CO_2 dans une suspension aqueuse de phosphate tricalcique gélatineux de 1 gr. à 1,50 gr. par litre et qu'on laisse la solution obtenue, à l'air, après avoir arrêté le courant carbonique, la liqueur qui était limpide laisse bientôt déposer un mélange de phosphate bicalcique cristallisé et de carbonate calcique. Evidemment, si on agissait avec les liqueurs extrêmement diluées, le phosphate bicalcique pourrait rester en solution, mais il se précipiterait néanmoins du carbonate calcique.

ACTION DE CHALEUR SUR LE LAIT ET SUR LE COMPLEXE :

Il est utile de rapprocher l'action que la chaleur a sur le lait de celle qu'elle a sur le complexe, car les faits énoncés dans l'étude de la première trouveront leur explication dans les recherches nécessitées par l'examen de la seconde.

Le lait chauffé à l'autoclave à des températures élevées, au-dessus de 100° en allant jusque vers 145° , coagule en une masse compacte. Les travaux de ORLA JENSEN et E. PLATTNER (279) sur cette question ont cherché à disséquer cette action, à rapporter à chaque composant du lait telle altération qui lui revient en propre. Lors des travaux de ORLA JENSEN et E. PLATTNER, on n'utilisait pas la détermination de l'acidité actuelle des liqueurs, mais ce que l'on savait bien cependant, c'est qu'il y avait une marche nette vers l'acidité, marche particulièrement rapide quand on arrivait à 130° . On pouvait se demander à quoi était dû le développement de celle-ci et penser peut-être qu'elle résultait d'une saponification de la caséine par l'eau sous pression à l'autoclave conduisant ainsi à une séparation de l'acide phosphorique, à la mise en liberté de nouveaux ions H.

Action sur le lait. — Des portions d'un même lait écrémé ont été chauffées pendant une demi-heure à 100° , 110° , 125° , 135° et 145° .

(279) ORLA JENSEN et E. PLATTNER. — De l'action du chauffage sur le lait de vache. — *Rev. Génér. du Lait*, 1904-1905, 6, 361, 388 et 419.

Voici ce qu'on obtient :

TABLEAU LXXXIV.

Laits chauffés à	pH	Aspect des laits
Témoin	6,40	
100°	6,29	Pas d'altération visible.
110°	5,89	Légèrement teinté en beige.
125°	5,66	Lait coloré, teinte café au lait, pas de coagulation.
135°	5,38	Coagulation, caillé mou, liquide d'exsudation trouble, ayant la couleur d'un café au lait plus foncé.
145°	4,71	Caillé ferme, lisse, liquide d'exsudation limpide, coloré en brun. La masse est plus claire que le caillé ; couleur café au lait.

Par le chauffage à 145°, on arrive, comme on le voit, au point isoélectrique : $pH = 4,71$, mais déjà, par chauffage à 135° avec $pH = 5,38$, c'est-à-dire au point où précipite le caséinate *monocalcique* de VAN SLYKE et BOSWORTH, on a un commencement de coagulation.

Voyons ce que devient le complexe dans les mêmes circonstances.

Action sur le complexe. — Un complexe ayant un pH initial de 6,87 a été chauffé pendant une demi-heure à 100°, 110°, 125°, 135° et 145° dans les mêmes conditions que ci-dessus le lait.

Voici l'aspect des liqueurs après chauffage :

Le témoin est un liquide opalescent, blanc bleuâtre par réflexion, tango par transparence.

TABLEAU LXXXV

Après chauffage à	Aspect des liqueurs
100°	Liquide blanc laiteux.
110°	Plus laiteux encore que le précédent, fin dépôt adhérent au fond du ballon.
125°	Liquide faiblement teinté ; dépôt assez abondant, gélatineux, en grains arrondis, dont le centre est clair, les bords plus blancs.
135°	Liquide plus teinté que le précédent en rose. Masse gélatineuse adhérente au fond du ballon, teintée en rose faible. Liquide surrageant trouble, teinté également.
145°	Masse gélatineuse adhérente au fond du ballon, plus rose encore que la précédente. Le liquide n'est plus trouble, il est clair, mais teinté.

Les résultats sont tout à fait comparables dans les deux cas.

Dans les expériences que nous venons de relever, nous n'avons envisagé que les températures élevées, au-dessus de 100. Mais déjà avant 100°, l'altération du lait considéré au point de vue de sa réaction vis-à-vis de la présure a commencé. Toutefois, comme le montrent ORLA-JENSEN et E. PLATTNER, les variations d'acidité ne sont pas considérables. L'acidité titrable diminue même à partir de 70°, jusqu'à 100 et

110, et ce n'est qu'au-delà de cette dernière température qu'elle va, au contraire, remonter et très fortement.

LES VARIATIONS DU pH. — Les expériences rapportées plus haut nous ont montré qu'entre le témoin et le lait chauffé à 100°, il n'est qu'une faible variation du pH, mais toutefois dans le sens d'une augmentation d'acidité. Jusqu'à 100° environ, à part la coagulation de l'albumine et de la globuline, le caséinate de calcium restant sensiblement inaltéré, les modifications qui peuvent se présenter et qui vont affecter l'emprésurage portent sur l'équilibre salin originel.

Insolubilisation des sels calciques. — Les sels de calcium s'insolubilisent, *parce qu'ils se saturent en calcium*, quand ils ne le sont pas, les sels acides devenant sels neutres, et *aussi parce qu'ils sont moins solubles à chaud qu'à froid*. Nous avons là l'explication du retard dans l'emprésurage, voire même l'absence totale de caillé pour les températures au-dessus de 100° ou, si l'on chauffe longtemps, pour les températures inférieures, à partir de 80°.

Du lait ayant 20° D. à l'origine est chauffé pendant une demi-heure, de 5° en 5°, à des températures différentes, de 40° à 120°, puis ramené à la température de 40° à laquelle il a été emprésuré. Nous allons apprécier ici l'influence des diverses températures, tantôt au-dessous, tantôt au-dessus de 100°.

Voici les résultats :

TABLEAU LXXXVI

	Temps de prise
Lait originel	220 sec.
Chauffé à 50°-52°	225 »
» 55°-56°	245 »
» 65°-66°	265 »
» 75°-76°	500 »
» 85°	1320 »
» 95°	2100 »
» 105°	7200 ou 2 heures.
» 110°	7500 »

A des températures supérieures, le lait n'a plus coagulé.

L'examen de la courbe qui rassemble tous ces chiffres est extrêmement intéressant. Il nous montre que *c'est à partir de 65°*, peut-être même un peu avant, qu'une altération nette du lait est apportée par la chaleur au point de vue de l'emprésurage. La pasteurisation basse qui reste aux environs de 62° à 63°, températures qu'elle entend ne pas dépasser, est implicitement dans les limites où l'action de la chaleur, même pendant ½ heure, n'altère pas sensiblement l'équilibre physico-chimique et salin du lait, puisque l'emprésurage n'est que très peu retardé. C'est à partir de 65° que la chaleur déforme nettement l'équilibre salin du lait, et c'est à cette déformation, encore une fois, que doit être rapporté le retard dans l'emprésurage, lequel résulte d'une précipitation des sels

GRAPHIQUE XXV
RETARD DANS LA GÉLIFICATION LABIQUE DU LAIT CHAUFFÉ $\frac{1}{2}$ HEURE AUX TEMPÉRATURES INDIQUÉES,
PUIS RAMENÉ A 40°

caloriques, ainsi que de nombreuses expériences d'auteurs non moins nombreux ont permis de l'assurer.

Au cours des recherches rassemblées dans ce travail, nous avons vu que la floculation, puis la prise en gel, sont fonction de la présence de sels calciques solubles ; *il faut une certaine quantité d'ions Ca solubles* en même temps qu'une certaine quantité d'ions H. Or, nous avons vu plus haut le pH d'un lait qui à l'origine est = 6,40 devenir à 110° : 5,89 et à 125° : 5,66. Il y a une augmentation notable d'acidité, et malgré cela, la coagulation par la présure s'affaiblit à 100° pour s'arrêter à 110°. *C'est qu'en dépit de l'augmentation de l'acidité, il y a eu insolubilisation des sels calciques* ; cette augmentation d'acidité résulte, en partie, sinon en totalité, de la décalcification du caséinate initial qui est ainsi transformé en un caséinate moins chargé en chaux, donc plus acide, potentiométriquement parlant.

Acidification de laits chauffés qui ne coagulent plus par la présure. — L'insolubilisation des ions Ca se justifie par les expériences suivantes qui ont porté sur des laits chauffés à des températures différentes.

Du lait qui a été chauffé à 85° et qui ne coagule plus en bloc, mais ne donne que des grumeaux mal soudés, coagule parfaitement par la présure en 75 secondes, si on le réacidifie avec de l'acide lactique pour lui ajouter 8° D. Il en est de même du lait chauffé à 115° et qui cependant ne coagulait plus : il fera prise avec une même acidité nouvelle en 120 secondes.

Nous avons étudié aussi l'action de l'acidification graduelle sur du lait chauffé à une haute température et qui ne coagulait plus par la présure.

Du lait stérilisé à 110° pendant une demi-heure et qui avait acquis, de ce fait, une teinte jaunâtre, a été acidifié, degré en degré D par de l'acide lactique, l'acidité de départ étant de 19° D. Le lait stérilisé ne coagulait pas, même au bout de 6 heures avec une acidification nouvelle de 1° D. Avec une acidification de 2° D, il y a un commencement de coagulation au bout de 5 h. 20 m.

Avec 3° D, au bout de 1 h. 10 m.

Avec 4° D, après 22 minutes.

Avec 5° D, au bout de 19 minutes. A ce moment apparaissent des petits grumeaux, avec une tendance à la soudure, ce qui ne se notait pas dans les acidifications antérieures.

Une acidification de 10° D fait faire prise au lait en 155 sec. et donne un caillé ferme.

Enfin, avec une acidification de 20° D, le caillé très ferme obtenu s'est formé au bout de 25 sec.

L'intérêt de ces observations ainsi que de celles qui précèdent est de montrer que dans l'action de la chaleur sur le lait, si forte soit-elle, serait-elle menée jusqu'à la stérilisation, 110° pendant 20 minutes, avec une modification de la teinte originelle qui devient celle du café au lait, *il n'y a pas en réalité d'altération chimique sensible de la caséine*

GRAPHIQUE XXVI

ACCENTUATION DE LA RAPIDITÉ DE L'EMPRESURAGE SUR DU LAIT STÉRILISÉ
A 110° PENDANT ½ HEURE, PUIS ACIDIFIÉ DE DEGRÉ EN DEGRÉ D.

ou plus exactement du caséinate. WRIGHT (280) le constate une fois de plus, même avec du lait chauffé $\frac{1}{2}$ heure à 120°.

Encore une fois, *c'est uniquement le système salin qui est troublé sous l'action de la chaleur, par la tendance à la transformation des sels calciques solubles en sels insolubles et à la néoformation de sels calciques, insolubles aussi*, résultant de l'action des phosphates mono- et bi-potasique sur le caséinate. Il suffit d'acidifier le lait pour provoquer la redissolution d'une partie des sels calciques et redonner au lait la possibilité de faire prise par la présure.

Chauffage à 75° pendant des temps différents. — Au lieu de chauffer le lait à des températures aussi élevées que celles qui sont exigées par la stérilisation, nous allons le porter à la première température critique nette, soit 75°, et nous le chaufferons pendant des temps variables.

Le lait original avait une acidité de 19°, il fait prise avec la présure utilisée, en 170 secondes. Les laits en expérience étaient ramenés, bien entendu, à 40° pour l'empresurage. Ils ont fait prise dans les temps suivants :

TABLEAU LXXXVII

ACTION DE LA CHALEUR A 75° PENDANT DES TEMPS VARIABLES SUR L'EMPRESURAGE

	Temps de prise
Lait témoin	170 sec.
Lait chauffé 1 minute	205 »
» 5 minutes	225 »
» 10 »	250 »
» 15 »	275 »
» 30 »	300 »

Alors que le caillé était encore très ferme après le chauffage de 1 minute, il l'est beaucoup moins après le chauffage de 5 minutes. Après 15 minutes, il est tout à fait diffusant, et devient de plus en plus mou au fur et à mesure que la durée du chauffage s'accroît. Pour 30 minutes, la coagulation est difficile à constater, ou du moins, la prise en bloc ; il y a bien flocculation, mais la soudure des flocons laisse à désirer.

Les essais dont il vient d'être question ont été faits avec une *présure faible*. Si l'on utilise la même présure, mais moins diluée, *plus forte*, on obtient les résultats suivants :

TABLEAU LXXXVIII

	Temps de prise
Lait originel	45 sec.
Lait chauffé pendant 1 min.	55 »
» 5 »	65 »
» 10 »	70 »
» 15 »	75 »
» 30 »	85 »
» 45 »	95 »
» 60 »	105 »

(280) N.C. WRIGHT. — The action of Rennet and of Heaton Milk. — *Bioch. Journ.* 1924, 18, 245.

Le graphique ci-joint donne les deux courbes correspondant aux emplois de la présure faible et de la présure forte. Leur examen est très suggestif, il nous montre à nouveau qu'avec une présure forte, on obtient un caillé là où, avec une présure faible, on n'avait qu'une floculation sans soudure des flocons, et quand, avec la présure faible, les caillés obtenus sont mous, ils le sont moins avec la présure forte. Nous voyons également que l'allure de la courbe dans le cas de la présure forte ne correspond pas à celle de la présure faible; elle se couche davantage sur la ligne des abscisses, et la différence dans les temps de coagulation entre les deux extrêmes est beaucoup moins marquée.

GRAPHIQUE XXVII

L'EMPRESURAGE DU LAIT CHAUFFÉ A 75° PENDANT DES TEMPS VARIABLES

Les caillés correspondants de la courbe du dessus sont plus mous, puisque plus lents à se former.

Présure faible = Présure forte + 1 fois $\frac{1}{2}$ son volume d'eau.

GRAPHIQUE XXVIII.

L'EMPRÉSURAGE DU LAIT CHAUFFÉ A DES TEMPÉRATURES DIFFÉRENTES
PENDANT 15, 30 ET 45 MINUTES

Chauffage à des températures différentes. — Enfin, dans une autre expérience, nous avons chauffé du lait à des températures différentes pendant 15, 30 et 45 minutes, puis nous avons ramené ces laits à 40° pour les emprésurer.

Le graphique qui suit nous montre quelle est l'allure des courbes obtenues en joignant les trois points correspondant aux temps de chauffe : 15, 30 et 45 minutes. Pour les températures de 55°, 60° et 65°, on peut dire qu'il y avait peu de différences dans les temps de prise pour les deux durées extrêmes du chauffage. C'est au delà de 65°, encore une fois, que nous apprécions, d'une part, l'influence de la température et, d'autre part, l'influence de la durée du chauffage.

Ces résultats coïncident tout à fait avec ceux dont il a été fait mention tout à l'heure.

Nous allons maintenant étudier en détail l'action de la chaleur sur le complexe phosphatique pour situer exactement la raison de son indifférence vis-à-vis du lab à un moment donné.

ACTION DE LA CHALEUR SUR LE COMPLEXE : CASÉINATE DE CALCIUM + PHOSPHATES DE CALCIUM

Dans un premier travail (281), alors que nous faisons jouer à l'état colloïdal, tant du phosphate que du caséinate, le rôle que nous avons rappelé dans des pages qui précèdent, nous nous étions demandé lesquels des deux sortes de micelles, les caséinatiques et les phosphatiques, étaient les plus sensibles à la chaleur. Dès l'instant que nous supposons que c'était le phosphate de calcium qui était l'élément déterminant de la coagulation labique, et que nous savions, d'autre part, que le fait de soumettre le lait à une température élevée portait atteinte à sa réaction vis-à-vis de la présure, il allait de soi que la chaleur devait altérer principalement le phosphate calcique.

Les phosphates insolubles de calcium, lorsqu'ils sont obtenus en dehors de tout support colloïdal protecteur, sont instables ; chauffés, de gélatineux qu'ils paraissent, ils deviennent opaques et précipitent.

LE SORT DE LA CASÉINE DANS LA RÉTENTION LACTÉE

par

Ch. PORCHER

et

E. MUFFET

Docteur ès-Sciences physiques

Docteur Vétérinaire

(Fin)

Nous avons aussi à faire intervenir les leucocytes dans la résorption

(281) Ch. PORCHER. — Action de la chaleur sur le complexe caséinate de chaux + phosphate de chaux. — Plus grande sensibilité des micelles phosphatiques, *C. R. Ac. Sc.*, 1926, 182, 1247.