LE LAIT

REVUE GÉNÉRALE DES QUESTIONS LAITIÈRES

SOMMAIRE

Mémoires originaux :

F. R. SANSONETTI. — Sur les flores bactérienne et fongique des caillés de lait (<i>A suivre</i>)	858
R. N. GÖRANSSON. — Quelques observations sur la mammite de la vache	874
A. FOURNIER. — Microbes saprophytes, microbes pathogènes et ferments lactiques. Aperçu sur la bactériothérapie lactique (<i>A suivre</i>)	878
E. VAILLANT. — Observations pratiques sur le calcul du rendement en beurrerie (<i>A suivre</i>)	887
Ch. PORCHER. — Le lait au point de vue colloïdal. — Recherches sur le mécanisme de l'action de la présure (<i>A suivre</i>)	900

Bibliographie analytique :

1 ^o Les Livres	918
---------------------------------	-----

2 ^o Journaux, Revues, Sociétés savantes	920
3 ^o Brevets	951

Bulletin bibliographique :

1 ^o Journaux, Revues, Sociétés savantes	952
2 ^o Brevets	956

Documents et informations :

COLLUMBIEN. — Rapport annuel du service sanitaire pour le bétail en Frise, Pays-Bas (<i>fin</i>)	957
La fabrication et la vente coopérative des beurres dans le Limbourg hollandais	963
Un nouveau matériau isolant dans l'industrie frigorifique	964
La verdunisation des eaux ...	965
Le contrôle du lait destiné à la ville de Stockholm	967
Bouteilles à lait en carton ...	967
Petite étude rétrospective sur le lait	968

AVIS AUX LECTEURS

Nos lecteurs ont pu se rendre compte des efforts que la revue *LE LAIT* n'a cessé de faire depuis qu'elle existe, tant pour accroître sa documentation en *Mémoire originaux*, en *Analyses*, en *Documents et Informations*, etc., que pour améliorer sa présentation.

Malheureusement —, c'est heureusement que nous devrions dire, — les envois lui parviennent si nombreux, si nombreuses sont les directions dans lesquelles elle doit puiser pour l'instruction de ses lecteurs, que nous prévoyons, pour 1931, un plus grand nombre de pages qu'en 1930, année qui dépasse très nettement, à ce point de vue, celle qui l'a précédée.

Le nombre de feuilles à ajouter, notre désir de publier chaque fois que cela est nécessaire, des planches en couleurs ou des phototypies qui coûtent cher — comme nous venons de le faire dans les derniers numéros et dans celui-ci même — nous mettent dans l'obligation de relever le prix de notre abonnement. Telle qu'elle est, la revue *LE LAIT* est trois fois moins chère que les publications analogues anglaises, américaines ou allemandes.

Certes, nos lecteurs désirent que *LE LAIT* continue mais, pour suivre, toujours avec plus d'application, la ligne qu'il s'est tracée, il ne peut le faire qu'en portant le prix de l'abonnement à partir du 1^{er} janvier 1931 à : 100 fr. pour la France, et 140 fr. pour l'Etranger.

MÉMOIRES ORIGINAUX

SUR LES FLORES BACTÉRIENNE ET FONGIQUE DES CAILLÉS DE LAIT

RÔLE DES SYMBIOSES DANS LA MATURATION DU CAMEMBERT

par

Mademoiselle FRANÇOISE SANSONETTI

Docteur en Pharmacie

(Suite)

1. — RÔLE DU SEL SUR LA FLORE FONGIQUE

A. — **Action sur le *Penicillium*.** — 1^o *Cultures sur lait*. — Le sel retarde le développement du *Penicillium*. Dès le 6^e jour, les cultures s'arrêtent au delà de 6 % de sel. Au bout d'un mois quelques colonies apparaissent avec 20 % de sel.

La caséine est fortement peptonisée.

2^o *Cultures sur caillé*. — Le 5^e jour, tout le caillé avec 0,5 % NaCl est couvert de *Penicillium* ; avec 4 %, quelques colonies seulement apparaissent. Le 11^e jour, quelques colonies isolées se forment sur le caillé salé à 8 %.

Le caillé se dessèche rapidement à l'étuve ; aucun développement ne se manifeste sur le caillé salé à 10 %. Le sel retarde donc le développement du *Penicillium*.

3^o *Cultures sur gélose de SABOURAUD*. — Le 2^e jour, les cultures couvrent la moitié de la gélose non salée ; le développement est réduit avec 2 % et 3 % de sel ; à peine quelques traînées grisâtres se montrent avec 6 % de sel. Le 3^e jour, des colonies se forment avec 8 %, 10 %, 12 % NaCl. Avec de plus fortes concentrations le *Penicillium* se développe péniblement. Après plus d'un mois seulement de culture, le *Penicillium* apparaît sur la gélose salée à 20 % (Photo 1).

Le sel retarde le développement du *Penicillium*, mais ne l'arrête qu'à de très fortes concentrations [entre 20 et 30 %].

B. — **Action sur l'Oïdium.** — 1^o *Cultures sur lait* : La teinte du

PHOTO 1. — Cultures de *Penicillium candidum* sur gélose de SABOURAUD salée de 0 à 20 % et datant de 45 jours. Le sel entrave le développement du *Penicillium* dont les cultures sont moins abondantes particulièrement au-dessus de 6 % de sel. Le *Penicillium* se caractérise par sa grande résistance au salage (limite : 20 à 30 %).

mycélium étant peu tranchée, son développement est difficile à suivre ; de plus le voile tombe souvent dans le liquide. Aussi n'avons-nous tenu compte que des cultures sur milieux solides.

2° *Cultures sur caillé* : Après 48 heures de culture, l'*Oïdium* a envahi presque tout le caillé non salé ; les colonies se montrent le 3^e jour avec 2 % et 4 % de sel. Une seule colonie apparaît le 4^e jour avec 6 % de sel ;

3° *Cultures sur gélose de SABOURAUD* : Après 24 heures de culture la gélose sans sel est entièrement recouverte d'*Oïdium* ; le développement est moindre avec 2 % et 3 % de sel, il se réduit à quelques traînées avec 4 % de sel. Le 2^e jour, l'*Oïdium* se développe en milieu salé à 6 % (Photo 2 et Fig. 3).

La souche d'*Oïdium* de LANGLAIS [86] donnait aussi de belles cultures sur un milieu salé à 6 %. D'après FETTICK [42], l'*Oïdium* ne pourrait proliférer au-dessus de 4 % de sel ; maints auteurs confirment cette limite. La souche de LANGLAIS provenant d'un Brie et la nôtre prélevée sur un Camembert semblent indiquer, chez les *Oïdium* provenant de fromageries, la faculté de s'adapter à de plus fortes concentrations salines. Cependant, il existe un écart considérable entre l'*Oïdium* et le *Penicillium* au point de vue de leur résistance respective au sel : alors que le *Penicillium* peut encore proliférer avec 20 % de sel, 8 % suffisent pour arrêter la croissance de l'*Oïdium* (Photos 1 et 2).

Flora fongique des fromages blancs.

A l'usine de Coulibœuf (Calvados), nous avons suivi, en même temps que la fabrication d'une date déterminée, la façon dont se comportait le même caillé salé différemment. Au moment du salage, des fromages blancs ont été prélevés et diverses portions ont été salées à des concentrations croissant de 0,5 à 30 %.

Le caillé trituré avec le sel était façonné en rectangles réguliers sur du papier sulfurisé. En même temps que les fromages de même date, les caillés salés ont étéensemencés avec des ferments sélectionnés, et portés au haloir. La fermentation des fromages et des caillés s'effectuait ainsi dans des conditions identiques.

Le caillé sans sel s'est couvert d'*Oïdium* dès le 2^e jour de culture ; des examens microscopiques du caillé ont montré le 5^e jour la présence simultanée de l'*Oïdium* et du *Penicillium* avec 1 %, 2 % et 4 % de sel ; jusqu'à 2 % de sel le caillé présente de légers plissements dus à l'*Oïdium*. A mesure que le pourcentage de sel augmente, le *Penicillium* prédomine sur l'*Oïdium* dont on ne trouve plus que de rares oïdies avec 8 % de sel.

De même qu'en milieux artificiels stériles, le *Penicillium* prolifère dans le caillé même avec 20 % de sel ; un salage de 8 % suffit à arrêter l'*Oïdium*.

Résistance des levures au salage. — CLAYTON [23] indique que

a

PHOTO 2. — Cultures d'*Oidium lactis* sur gélose de SABOURAUD salée de 0 à 8 ‰ et datant de 48 h. L'*Oidium* est très sensible au sel; 8 ‰ suffisent à arrêter les cultures, alors que le *Penicillium* peut encore proliférer avec 20 ‰ de sel.

(a) L'étiquette absente sur ce tube portait 2 ‰ de sel.

4 % de sel arrête le développement des Levures. D'une façon constante, les examens microscopiques ont montré la présence de Levures sur le caillé salé à 10 %. Ce fait constitue, avec celui de l'*Oïdium*, un deuxième exemple de l'adaptation particulière au sel des organismes provenant de fromageries.

Dose fromagère de sel. — Les caillés salés avec des quantités croissantes de sel et soumis aux mêmes conditions que les fromages, ont été présentés séparément, à quatre spécialistes. Il s'agissait de fixer quel échantillon portait la croûte moisie typique qu'on recherche. En tenant compte de l'épaisseur de la couche mycélienne et du goût du caillé, ils ont unanimement conclu que le meilleur salage se trouvait dans les environs de 3 %. Avec 2 % de sel, l'épaisseur de la Moisissure aurait été suffisante, mais la pâte présentait un goût fade ; avec 4 % le fromage aurait été trop salé. THOM indique que le salage du Camembert doit être de 2,5 %, chiffre fort voisin de celui qui a été trouvé. Cette valeur du salage empiriquement déterminée paraît convenir à la plupart des produits laitiers (GUTSCHY, CLAYTON [23]).

Dans le Camembert, un salage de 3 % permet donc le développement simultané du Penicillium (limite 20 %) et de l'Oïdium (limite 6 %) ; un salage exagéré élimine uniquement l'Oïdium. (Fig. 3).

2. — ROLE DU SEL SUR LA FLORE BACTÉRIENNE

A. — **Action sur les ferments lactiques.** — En milieu alcalin, après 24 heures de culture, la gélose sans sel est entièrement couverte de bactéries ; les cultures s'appauvrissent à mesure que la concentration en sel augmente ; aucun développement ne se manifeste au delà de 4 % de sel. Sur le milieu salé à 6 %, les colonies se forment à partir du 4^e jour (Photo 3) ; le développement est maximum avec 1 % de sel.

Sur un milieu acide, en tous points identique à celui sur lequel ont été cultivées les Moisissures, les bactéries forment dans les premières 24 heures un léger enduit en l'absence de sel ; du 3^e au 6^e jour des colonies se montrent sur les géloses salées à 3 % et 4 % (Photo 3).

En milieu alcalin, les ferments lactiques peuvent donc supporter jusqu'à 6 % de sel y compris ; en milieu acide ils ne peuvent proliférer au delà de 4 % de sel.

B. — **Action sur les bactéries des fromages mal salés.** — L'ensemble des bactéries, recouvrant les fromages mal salés, ont été cultivées sur les géloses salées, dans les mêmes conditions que les ferments lactiques. Seul le milieu sans sel permet la formation de rares colonies ; même après plusieurs mois de culture, aucun développement ne s'est manifesté dans les tubes salés de réaction acide. Ces bactéries, contrairement aux ferments lactiques, ne résistent pas au salage en milieu acide.

ROLE DU SEL SUR L'ENSEMBLE DE LA FLORE FROMAGÈRE. — Les

PHOTO 3. — Cultures de ferments lactiques du « rouge » sur gélose de SABOURAUD de réaction alcaline et de réaction acide, salée de 0 à 6 %. Ces bactéries peuvent supporter jusqu'à 6 % de sel y compris, en milieu alcalin, et 4 % de sel en milieu acide. Leur résistance au sel en milieu acide est à noter.

courbes de résistance au sel des différents organismes montrent qu'un fromage normalement salé (3 %) et acide, offre un milieu favorable au développement de trois organismes : *Penicillium* (résistance 20% de sel), *Oidium* (6 %) et ferments du rouge (4 %). Par contre, un tel salage élimine les espèces bactériennes recouvrant les fromages sans sel.

Fig. 3. — Résistance des organismes au sel en milieu acide

Penicillium (—) *Oidium* (— — —)

Ferments du rouge (.....)

Bactéries du défaut de salage (— . — . —)

En salant exagérément les fromages, l'*Oidium* et les ferments lactiques du rouge sont éliminés ; le *Penicillium* forme alors une croûte épaisse.

ROLE DES SYMBIOSES EN RELATION AVEC LE SALAGE

L'étude des symbioses a fait l'objet de travaux divers : MARSHALL [98], GRATZ [53], VIRTANEN [141], ROGERS [118] ont montré l'action favorisante ou inhibitrice, entre des bactéries de différentes espèces. TROILI PETERSON [137], BARTHEL [7], GRIMMER [57], GOY [52], DVORAK [71], GOLDING [46], ont étudié l'effet résultant d'associations symbiotiques entre Moisissures et bactéries.

Nous avons cherché à préciser comment se comportaient l'*Oidium* et le *Penicillium* ensemencés simultanément sur des milieux salés à des pourcentages variables ; nous avons ensuite étudié l'action des ferments lactiques, sur le développement des Moisissures seules, ou en symbiose.

Milieu. — La gélose de SABOURAUD (pH = 5,3) préparée comme dans les précédentes expériences, a été salée de 0 à 8 %.

Méthode de culture. — Nous avons ensemencé simultanément : les organismes seuls :

Penicillium sur milieux salés 0 à 8 %

<i>Oïdium</i>	»	»
Bactérie	»	»

les symbioses :

<i>Oïdium</i> + <i>Penicillium</i>	»	»
<i>Oïdium</i> + Bactérie	»	»
<i>Penicillium</i> + Bactérie	»	»
<i>Oïdium</i> + <i>Penicillium</i> + Bactérie	»	»

Tous les organismes, seuls ou en symbiose ont été cultivés sur 2 tubes aux pourcentages suivants de sel : 0 %, 2 %, 3 %, 4 %, 6 %, 8 %. Les ensemencements ont tous été effectués d'une façon identique, avec des émulsions dans l'eau stérile de l'organisme ou des symbioses. Après qu'on eut déposé dans chaque tube, à l'aide de pipettes Pasteur stériles, un même nombre de gouttes, les cultures ont été portées à l'étuve à 24°.

SYMBIOSE *PENICILLIUM* + *OÏDIUM* COMPARÉE A *PENICILLIUM* ET *OÏDIUM* SEULS

D'une façon constante, l'*Oïdium* seul ou en symbiose se développe, dans les premières 24 heures, jusqu'à 4 % de sel y compris. Le *Penicillium* en culture pure apparaît le 2^e jour jusqu'à 3 % de sel y compris. Mais, en symbiose avec l'*Oïdium*, son développement est d'autant plus retardé que le milieu est moins salé. Tandis que les premières colonies de *Penicillium* percent sur l'*Oïdium* le 2^e jour, avec 3 % de sel, ce n'est que le 3^e jour que les milieux moins salés en sont couverts. Le 4^e jour seulement, il apparaît sur le milieu non salé. En pratique, les fromages sans sel ne portent pas la moindre trace de *Penicillium* ; on suppose que l'*Oïdium* formant une membrane vivante l'empêche de percer. Pourtant, quelle que soit l'épaisseur de l'*Oïdium*, sur du caillé stérile normal, le *Penicillium* ensemencé en symbiose forme toujours des colonies apparentes. Par contre, avec du caillé provenant de laits altérés et acides, le *Penicillium* même en culture pure ne forme que de rares colonies ; en symbiose avec l'*Oïdium* souvent même il ne peut se développer. Aussi, y aurait-il lieu de se demander si les propriétés dysgénésiques du milieu ne doivent pas aussi être mises en cause pour expliquer l'absence du *Penicillium* sur certains caillés.

SYMBIOSE *PENICILLIUM* + BACTÉRIE, ET *OÏDIUM* + BACTÉRIE COMPARÉES AUX MOISSURES SEULES

DVORAK [72] signale que le *Penicillium* prospère mieux en présence de bactéries lactiques. Notre souche de ferments lactiques du « rouge » ne montre aucune action bien déterminée ni sur l'*Oïdium* ni sur le *Penicillium*.

a

PHOTO 4. — Culture de la Symbiose *Penicillium*+*Oidium* sur gélose de SABOURAUD acide salée de 0 à 10 %. L'*Oidium* qui prédomine dans le tube sans sel, et dans celui salé à 1 %, cède la place au *Penicillium* à mesure que le salage augmente. Au-dessus de 6 % de sel, les cultures de *Penicillium* sont pures.

(a) Dans ce tube et le suivant la culture de l'*Oidium*, d'aspect plus grisâtre que celle du *Penicillium*, semble moins marquée

a

PHOTO 5. — Culture de la Symbiose *Penicillium* + *Oïdium* + ferments lactiques du rouge, dans des conditions identiques à celles de la Symbiose *Penicillium* + *Oïdium* (Photo 4). Les ferments du rouge favorisant le *Penicillium*, on n'observe plus la moindre trace d'*Oïdium* dans le tube sans sel et dans celui salé à 1 ‰. En l'absence de ferments du rouge, l'*Oïdium* au contraire l'emporte sur le *Penicillium* (Photo 4).

SYMBIOSE *PENICILLIUM* + *OÏDIUM* + BACTÉRIE COMPARÉE

A SYMBIOSE *PENICILLIUM* + *OÏDIUM*

La comparaison de ces deux symbioses est des plus frappantes : le *Penicillium* prédomine toujours dans la symbiose *Penicillium* + *Oïdium* + ferments lactiques. Alors que les bactéries ne semblent favoriser ni l'*Oïdium*, ni le *Penicillium* séparément, elles activent nettement le *Penicillium* quand il est associé à l'*Oïdium*. Le 4^e jour de culture, la différence entre les deux symbioses est des plus nettes, surtout en milieu non salé, et salé à 1 % : la symbiose Moisissures + ferments lactiques est entièrement couverte de *Penicillium* ; l'*Oïdium* est submergé ; ce dernier occupe par contre la presque totalité de la gélose où les Moisissures seules ont été ensemencées ; une seule colonie de *Penicillium* s'étend au-dessus de l'*Oïdium*. Les différences entre les symbioses des Moisissures seules et celles des Moisissures associées aux ferments lactiques sont moins accusées à mesure que la concentration en sel augmente. L'acidité et le sel gênent les ferments lactiques qui favorisent le *Penicillium* ; aussi, avec 4 % de sel, le *Penicillium* est à peu près aussi abondant dans les symbioses de Moisissures seules et celles des Moisissures + ferments lactiques. Enfin, avec 6 % de sel, les ferments lactiques ne pouvant plus proliférer, les deux symbioses sont identiques.

Les ferments lactiques du « rouge » que nous avons isolés accélèrent donc remarquablement le développement du *Penicillium* dans la symbiose *Oïdium* + *Penicillium* + ferments lactiques (Photo 5) ; comme l'a déjà signalé GOLDING [46] pour les fromages à pâte bleue, il y aurait donc lieu pour le Camembert de choisir également avec soin les ferments lactiques dont l'influence sur le développement des Moisissures est parfois très marquée.

ROLE DE LA RÉACTION DU MILIEU

Un milieu nutritif, aussi riche soit-il en éléments carbonés azotés et minéraux convenablement choisis, peut donner lieu à des cultures misérables si la réaction varie au delà de certaines limites. Les milieux alcalins conviennent aux bactéries ; les Moisissures ont au contraire leur optimum en milieu acide. Dans le caillé, Moisissures et bactéries, aux besoins semble-t-il opposés, se trouvent constamment en présence. L'acidité du caillé étant variable, nous avons cherché à déterminer quelle sélection entraîne la réaction du milieu sur la flore fongique et bactérienne du caillé.

Milieux de culture. — Une échelle acide et une échelle alcaline ont été préparées pour le *Penicillium*, l'*Oïdium*, et les ferments lactiques, avec de la gélose de SABOURAUD. Pour la série acide nous avons employé de l'acide lactique à trois titres différents : décimormal (N/10), normal (N) et cinq fois normal (5N).

La série alcaline a été préparée avec de la soude aux mêmes titres. On stérilise préalablement à 115° pendant 1/4 d'heure, les solutions titrées, ainsi que la gélose de SABOURAUD neutre, répartie en tubes par portions de 10 cm³. Lorsque les géloses sont légèrement refroidies, on verse à l'aide de pipettes stériles 0,1 cm³ — 0,2 cm³ — 0,4 cm³ — 0 cm³ 6 — 0,8 cm³ d'acide ou d'alcali. L'échelle acide a été réalisée avec 1 cm³ — 1,2 cm³ — 1,4 cm³ — 1,6 cm³ d'acide lactique 5 fois normal. Nous avons eu ainsi une gamme ininterrompue dont la réaction passait progressivement d'une acidité maxima égale à 16 % d'acide lactique (avec l'acide 5 fois normal) à une alcalinité équivalente à 8 % de soude (avec la soude 5 fois normale). Les cultures ont été portées à l'étuve réglée à 24°.

SEUILS DU *PENICILLIUM*

Dès le 2^e jour, le *Penicillium* s'étend simultanément sur les milieux de réaction acide et de réaction alcaline. Cependant, la zone de croissance est beaucoup plus étendue sur l'échelle acide où des colonies apparaissent même avec 2 % d'acide lactique 5 fois normal. Par contre, en milieu alcalin, 1 % de soude représente une dose inhibitrice. Le *Penicillium* atteint dès le 4^e jour son seuil en milieu acide, où les dernières cultures apparaissent avec 4 % d'acide lactique 5 fois normal (Photo 6). Le *Penicillium* gravit plus lentement l'échelle alcaline ; le 15^e jour seulement le seuil est porté à 4 % de soude 5 fois normale (Photo 7).

Le *Penicillium* est donc susceptible de proliférer sur des milieux dont la réaction est comprise entre 4 % d'acide lactique 5 fois normal, et 4 % de soude 5 fois normale (Fig. 4).

Cependant l'optimum se place en milieu acide, dans les environs de 4 % d'acide lactique normal.

SEUILS DE L'*OÏDIUM*

Déjà dans les premières 48 heures, la zone de croissance de l'*Oïdium* est beaucoup plus étendue que celle du *Penicillium*. Sur l'échelle acide, des colonies se forment même avec 6 % d'acide lactique 5 fois normal ; sur l'échelle alcaline les cultures s'arrêtent au delà de 2 % de soude 5 fois normale. Des colonies apparaissent ensuite avec 8 % d'acide lactique 5 fois normal (3^e jour) et 14 % d'acide lactique à la même concentration (20^e jour). Dès lors le seuil en milieu acide est atteint. En milieu alcalin le seuil est porté le 10^e jour à 4 % de soude 5 fois normale (Fig. 4 et Photo 7).

L'*Oïdium* et le *Penicillium* ont donc même seuil en milieu alcalin : 4 % de soude 5 fois normale ; l'*Oïdium* l'atteint même 5 jours plus tôt que le *Penicillium*. Cependant, il est généralement admis que l'*Oïdium* ne peut proliférer en milieu alcalin ; de là on conclut que sur le caillé neutre ou légèrement alcalin l'*Oïdium* n'est plus à craindre, son activité

PHOTO 6. — Cultures de *Penicillium* et d'*Oidium* sur milieu neutre additionné de quantités croissantes d'acide lactique 5 fois normal. Les cultures de *Penicillium* s'arrêtent au delà de 4 % d'acide lactique 5 N. L'*Oidium*, plus résistant vis-à-vis des milieux acides, donne des cultures abondantes, même avec 14 % d'acide lactique 5 fois normal.

PHOTO 7. — Cultures de *Penicillium* et d'*Oidium* sur milieu neutre additionné de quantités croissantes de soude 5 fois normale. Les deux Moisissures ont même seuil : 4 ‰ de soude 5 fois normale.

Photo 8. — Ensemencement sur gélose SABOURAUD des moisissures et des ferments lactiques du « rouge », seuls ou associés.

Noter la résistance à l'acidité des ferments lactiques du rouge.

P = *Penicillium* ; O = *Oïdium* ; B = ferments lactiques du rouge.

étant arrêtée automatiquement. Notre souche, bien que présentant un optimum dans les environs de 8 % d'acide lactique normal, se développe néanmoins rapidement en milieux alcalins.

SEUILS DES FERMENTS LACTIQUES

L'examen de la courbe des ferments lactiques met en évidence leur résistance à l'acidité que nous avons déjà signalée. Leur seuil correspond à 6 % d'acide lactique normal. En milieu alcalin, le seuil est à 2 % de soude 5 fois normale. On ne saurait fixer à la bactérie un

Fig. 4. — Résistance des organismes à l'acidité et à l'alcalinité
Penicillium (—)
Oidium (— — —), ferments lactiques (.....)

optimum précis ; les cultures sont aussi abondantes avec 8 % de soude normale qu'avec 8 % d'acide lactique décimormal.

De l'aspect des courbes précédentes, on peut conclure que tout milieu favorable au développement du *Penicillium* convient aussi à l'*Oidium*. Mais, un milieu très acide (au delà de 4 % d'acide lactique 5 fois normal) permet seulement la prolifération de l'*Oidium*. C'est semble-t-il une des raisons pour lesquelles les caillés provenant de laits d'été, toujours acides, se couvrent rapidement d'*Oidium*. Nous retiendrons aussi que les ferments lactiques du rouge peuvent prospérer dans une zone assez étendue de l'échelle acide. Le *Penicillium*, l'*Oidium* et les ferments du rouge pourront donc se développer simultanément sur du caillé acide (Photo 8).

ACTION DE LA TEMPÉRATURE

Le *Penicillium*, l'*Oidium* et les ferments lactiques supportent mal les hautes températures. Après quelques jours de culture à 38°, les ferments lactiques ne manifestent plus aucune vitalité ; l'acidité du lait ensemencé, qui s'était légèrement accentuée dans les premières 48 heures, reste ensuite constante. L'*Oidium* et le *Penicillium* ne peuvent proliférer sur la gélose de SABOURAUD acide maintenue à 38°.

Entre 18° et 27°, les Moisissures et les ferments lactiques donnent de belles cultures ; leur développement est d'autant plus rapide, surtout pour l'*Oidium*, que la température se rapproche de 22°.

Les basses températures entravent le développement des Moisissures aussi bien que celui des bactéries. L'*Oidium* cependant est l'élément le plus sensible au froid ; à + 4° les cultures sont retardées de 18 jours environ, tandis que le *Penicillium* ne subit qu'un retard de 9 jours. Les colonies bactériennes sont nombreuses le 9^e jour même en milieu acide.

On peut donc entraver la croissance de l'*Oidium* en abaissant la température. C'est semble-t-il ce qui dictait le geste empirique des anciens fromagers qui l'été, au lieu de chauffer leur salle de fabrication, s'efforçaient au contraire de la rafraîchir. L'aération à laquelle ils avaient recours devait probablement retarder le développement de l'*Oidium* tout en permettant d'éviter un salage exagéré. Il était plus facile dans ces conditions au *Penicillium* et aux ferments du rouge de prendre la prédominance.

(A suivre)

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LA MAMMITE DE LA VACHE

par R. N. GÖRANSSON

Médecin-Vétérinaire des Services d'Inspection des Denrées Alimentaires
à Anvers.

Un facteur des plus importants de l'amélioration de l'approvisionnement en lait est la bonne hygiène des vacheries, l'excellente santé du bétail laitier. On peut affirmer que : « Pas de lait sain sans vaches saines » est un axiome, que celui qui a quelque notion de l'hygiène du lait ne s'autorise pas de discuter. Cependant, bien que depuis nombre d'années l'attention des pouvoirs publics fût attirée sur ce facteur de la plus haute importance pour l'hygiène publique, rappelons que déjà en 1903, au premier Congrès international de Laiterie, tenu à Bruxelles, fut voté le vœu suivant : « Il importe qu'on institue une inspection sanitaire et hygiénique des vacheries, dont le lait est destiné à la consommation publique » (1) ; on a vu, dans certains

(1) *Annales de Médecine vétérinaire*, 1903, septembre-octobre, n° 9-10, p. 577.