LE LAIT

REVUE GÉNÉRALE DES QUESTIONS LAITIÈRES

SOMMAIRE

Mémoires originaux :

- G. J. HUCKER et P. A. HANSEN.
— Valeur relative des examens dans la mammite chronique des bovidés (*fin*) . . . 337
- J. PIEN, R. MARTIN et M. BERGIER.— Etude de l'appréciation de la qualité des caésines lactiques (*à suivre*) . . . 356
- A. M. LEROY.— Une méthode de contrôle de l'alimentation des vaches laitières (*fin*) . . . 366
- C. HUYGE.— Contribution à l'étude des beurres belges (*fin*) . . . 374

Bibliographie analytique :

- 1° Les livres . . . 385
- 2° Journaux, Revues, Sociétés savantes . . . 389
- 3° Brevets . . . 425

Bulletin bibliographique :

- 1° Journaux, Revues, Sociétés savantes . . . 426
- 2° Brevets . . . 430

Documents et informations :

- C. GORINI.— Rapport sur le mouvement pour la production hygiénique du lait dans différents pays . . . 431
- La boisson pour vache laitière . . . 442
- Définition des principales espèces de fromages . . . 443
- Réglementation concernant les produits laitiers en Hollande . . . 447
- XII^e Congrès international de Médecine vétérinaire . . . 447

MÉMOIRES ORIGINAUX (1)

VALEUR RELATIVE DES EXAMENS DANS LA MAMMITE CHRONIQUE DES BOVIDÉS

par

G. J. HUCKER et POUL ARNE HANSEN (2)

(New York State Agricultural Experiment Station Geneva, New York, U.S.A.).

(*Fin.*)

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENCE DE TISSU FIBREUX DANS LA MAMELLE ET LA PRÉSENCE DE STREPTOCOQUES DANS LE LAIT. — Une étude de 264 quartiers, prolongée pendant 10 mois, montra que seulement 11% approximativement étaient exempts d'indurations ou de tissu fibreux. Les autres 89% présentaient du tissu affecté à un degré quelconque. L'observation la plus intéressante faite à cet

(1) Reproduction interdite sans indication de source.

(2) Traduction de C. WOLF.

égard (tableau 6) fut qu'on ne trouva pas de streptocoques pendant cette période dans le lait des quartiers exempts de tissu fibreux.

TABLEAU 6.

RAPPORT ENTRE LA PRÉSENCE DE TISSU FIBREUX DANS LA MAMELLE ET LA PRÉSENCE DE STREPTOCOQUES DANS LE LAIT.

Proportion de tissu fibreux	Nombre de quartiers étudiés	o/o montrant des streptocoques
Absente	30	0
Légère	76	5
Distincte	100	24
Marquée	58	10

Les 30 quartiers qui, lors de l'examen physique, furent trouvés souples sans zones indurées ou indurations, ne décelèrent par ailleurs aucun streptocoque. De ces résultats, il apparaît probable que là où des expérimentateurs antérieurs trouvèrent des streptocoques dans le lait fraîchement traité, un examen de la mamelle aurait montré la présence de tissu fibreux.

Ces observations soulèvent la question de la nature de la flore dite « normale » de la mamelle. Certains expérimentateurs ont admis qu'un certain nombre de streptocoques sont des habitants normaux de la mamelle. Ce qui précède montre, toutefois, que ce n'est pas le cas si les mamelles normales sont celles qui sont exemptes de tissu fibreux. D'un autre côté, on ne doit pas en conclure que toutes les mamelles qui ont des tissus indurés donneront des streptocoques.

Des 234 quartiers montrant des indurations à l'examen physique, 39% seulement furent trouvés donnant nettement dans le lait des streptocoques. Il est aussi intéressant de noter que le lait de la majorité des quartiers donnant des streptocoques contenait de ces germes dans tous les échantillons, indiquant que dès que ceux-ci apparaissent, leur présence est plus ou moins constante. Les quartiers indurés dans lesquels on ne trouva pas de streptocoques en restèrent exempts pendant la période d'observation comme les quartiers dans lesquels on n'avait pas trouvé de tissu fibreux. On en conclut que les streptocoques ne sont trouvés que dans le lait de mamelles ayant formé du tissu fibreux. D'un autre côté, toutes les mamelles indurées n'éliminent pas de streptocoques.

La variation hebdomadaire du nombre des streptocoques dans le lait des 4 quartiers d'une même bête fut trouvée exagérée. On

nota qu'à certains intervalles, le lait d'un quartier donné était pratiquement exempt de streptocoques en longues chaînes tandis que des examens ultérieurs en montraient des nombres relativement importants.

RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DES STREPTOCOQUES DANS LE LAIT ET CELUI DES LEUCOCYTES. — Une étude ayant duré 10 mois d'un échantillon composé des 4 quartiers de 133 vaches (tableau 7) a montré que 78 éliminaient constamment plus de 500.000 cellules par centimètre cube dans le lait. Une étude ultérieure de ces vaches montra aussi que toutes contenaient, à un moment donné pendant cette période, des streptocoques.

TABLEAU 7.

RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DES STREPTOCOQUES ET CELUI DES LEUCOCYTES DANS LE LAIT.

Nombre de vaches	Plus de 500.000 cellules par centimètre cube		Moins de 500.000 cellules par centimètre cube	
	Streptocoques présents	Streptocoques absents	Streptocoques présents	Streptocoques absents
133	78	0	4	51

D'un autre côté, des 55 vaches montrant moins de 500.000 leucocytes par centimètre cube, 4 seulement montrèrent des streptocoques à un moment quelconque, pendant ces observations. En d'autres termes, si les vaches éliminant de grandes quantités de leucocytes sont tenues en observation, leur lait contiendra généralement des streptocoques en longues chaînes à un moment donné pendant la lactation.

Une étude du rapport de la présence simultanée de cellules et de streptocoques dans des échantillons de quartiers a montré des résultats quelque peu différents de ceux trouvés dans le cas d'échantillons composés. Une étude de 117 quartiers (tableau 8) qui montraient une sclérose prononcée montra que 20 éliminaient plus de 500.000 cellules par centimètre cube, et on n'observa aucun streptocoque dans le lait d'un quelconque de ces quartiers.

Des observations montrèrent que des vaches avec un quartier éliminant un nombre excessif de leucocytes élimineront des streptocoques dans un des quartiers à un moment donné pendant la lactation. Toutefois, ces streptocoques ne sont pas toujours dans le quartier éliminant le grand nombre de cellules. D'un autre côté,

TABLEAU 8.
RAPPORT ENTRE LE NOMBRE DE STREPTOCOQUES
ET LE NOMBRE DE LEUCOCYTES DANS LE LAIT DE QUARTIERS
ATTEINTS DE SCLÉROSE MARQUÉE.

Nombre de quartiers	Plus de 500.000 cellules par centimètre cube		Moins de 500.000 cellules par centimètre cube	
	Strepto- coques présents	Strepto- coques absents	Strepto- coques présents	Strepto- coques absents
117	47	20	6	27

tous les quartiers producteurs de nombreuses cellules n'éliminent pas des streptocoques.

Ce rapport particulier exige d'être étudié avec soin pour déterminer si c'est un fait réel ou une simple coïncidence.

Une autre observation intéressante (tableau 8) est le fait que sur une période d'observation de 10 mois, 27 de ces 117 quartiers atteints de sclérose marquée n'ont donné ni cellules ni streptocoques dans le lait.

LA PROPORTION DE CHLORURES COMME INDICATION DE LA PRÉSENCE DE MAMMITE CHRONIQUE. — Dans la présente recherche, une comparaison entre la teneur en chlore du lait de plus de 100 quartiers (tableau 9) et d'autres tests, ainsi qu'un examen *post-mortem* de ces quartiers, indiqua que ce test des chlorures pouvait être très précis pour déceler les mamelles qui sont devenues fibreuses ou indurées à un degré quelconque.

On nota dans ces études qu'un minimum de 0,16 % devait être adopté comme indiquant une proportion anormale de chlorures dans le lait. On trouva que 90 % des quartiers ayant plus de 0,16 % de chlorures donnaient aussi une épreuve de la catalase positive et 90 % de ces échantillons furent obtenus de mamelles qui étaient plus ou moins fibreuses. Toutefois, si on estime que 0,14 % est la proportion maximum dans le lait normal, on trouve moins de rapport entre le taux des chlorures et l'état de la mamelle dont l'échantillon provient.

Quoiqu'un excès de chlorures indique généralement une condition anormale de la mamelle, rendant ainsi le test relativement précis, son utilisation comme méthode régulière présente certains inconvénients. Pour qu'on puisse se fier aux résultats, les essais doivent être effectués par un expérimentateur de laboratoire spécialement habitué à déterminer le point final du titrage. Ce test est probablement le plus délicat de toutes les méthodes connues

TABLEAU 9.

RAPPORT ENTRE LA PROPORTION DES CHLORURES ET D'AUTRES TESTS POUR DÉCELER LES QUARTIERS INFECTÉS.

TAUX DES CHLORURES	POURCENTAGE MONTRANT DES RÉACTIONS POSITIVES								
	Bleu de bromo- thymol	Bol d'essai de traite	Moins de 4 o/o de lactose	Strepto- coques sur veau- agar	Colonies alpha ou bêta sur sang- agar	Strepto- coques dans échan- tillons incubés	Sclérose à l'examen post- mortem	Pus à l'auto- psie	Catalase
Moins de 0,13 o/o.....	0	5	3	8	10	4	36	5	51
De 0,14 à 0,15 o/o.....	0	6	13	16	14	6	65	10	73
Plus de 0,16 o/o.....	7	16	51	28	21	26	90	10	90

pour déceler des infections de la mamelle anciennes ou existantes, mais il est mieux adapté pour les travaux spéciaux de recherches que pour la recherche habituelle de la mammite.

UTILISATION DE L'ÉPREUVE DE LA CATALASE POUR DÉCELER LA MAMMITE CHRONIQUE. — De nombreux chercheurs, particulièrement en Allemagne, ont utilisé l'épreuve de la catalase pour déceler la mammite aiguë. Ce test est basé sur le principe que les mamelles infectées sécrètent généralement du lait riche en catalase. Cette catalase peut être décelée par la propriété qu'a le lait de produire de l'oxygène par suite de la dissociation de l'eau oxygénée.

En étudiant les résultats obtenus par ce test, et en les comparant avec les résultats d'autres épreuves, on trouva qu'ils constituaient une méthode extrêmement délicate pour désigner les vaches ayant une infection active. Toutefois, les résultats indiquaient qu'elle n'était, ni plus délicate, ni plus précise que les autres méthodes qui sont exécutées plus facilement et qui demandent moins de temps et moins d'instruments.

Pour cette raison, nous sommes d'avis que l'épreuve de la catalase, quoique assez précise et assez délicate pour déceler les infections de la mamelle, n'est pas à recommander comme méthode habituelle de détection de la mammite chronique.

RAPPORT ENTRE LA PROPORTION DE LACTOSE DANS LE LAIT ET L'EXISTENCE DE MAMMITE. — Il a été trouvé par de nombreux chercheurs que le lactose dans le lait est diminué quand la mamelle est, ou a été, infectée à un point tel que le tissu sécréteur a été lésé. Pour cette raison, quand il y a moins de 4,0% de lactose, on estime que le lait provient d'une mamelle anormale.

L'utilisation de ce test, comme moyen de déceler les mamelles anormales, est soumise à certaines réserves, quoiqu'on puisse la considérer comme une méthode relativement précise pour reconnaître le lait anormal. Ce test semble être moins précis que l'épreuve du chlore, mais plus précis pour déceler les infections présentes ou passées que beaucoup d'autres épreuves.

MÉTHODES DE CULTURE POUR DÉCELER LA MAMMITE CHRONIQUE.

— La méthode la plus communément employée actuellement pour déceler les vaches ayant des infections de la mamelle est la méthode habituelle de la plaque d'agar, dans laquelle la présence de petites colonies punctiformes de streptocoques signifie infection.

L'utilisation de la méthode de la plaque implique l'adoption du milieu le plus convenable pour le développement des streptocoques ayant envahi la mamelle. L'agar dit standard adopté par l'Association américaine d'Hygiène publique pour l'analyse du lait est un des milieux les moins convenables pour déceler les quartiers infectés.

L'addition de glucose ou de lactose à ce milieu augmente sa valeur d'une façon considérable. Toutefois, la méthode de la plaque devient beaucoup plus convenable pour le résultat cherché si le milieu d'agar-standard est remplacé par un bouillon de veau-agar auquel on a ajouté un peu d'hydrate de carbone. On a trouvé qu'en employant un milieu au bouillon de veau, on décelait approximativement la moitié des mamelles infectées.

L'addition de globules rouges de cheval au milieu de bouillon de veau ne le rendit pas plus convenable pour le but à atteindre. Le bouillon de veau-sang de cheval-agar décéla moins de 40 % des mamelles évacuant des streptocoques. La méthode de culture trouvée la plus effective pour déceler les streptocoques dans la mamelle fut la méthode Burri des plaques d'agar. Environ 65 % des mamelles infectées donnèrent des colonies sur les plans inclinés.

La méthode des tubes inclinés d'agar a certains désavantages en ce sens que les numérations réelles d'organismes obtenues peuvent être ou ne pas être précises. D'un autre côté, la petite quantité de matériel nécessaire, la rapidité et la facilité de la méthode, ainsi que la précision relative de l'épreuve, le recommandent comme une méthode de culture très utile pour l'étude de la flore de la mamelle.

MÉTHODES MICROSCOPIQUES UTILISÉES POUR DÉCELER LA MAMMITE CHRONIQUE. — L'emploi du microscope pour l'examen du lait a indiqué ses possibilités pour déceler les vaches portant un nombre excessif de streptocoques. La précision et la simplicité de la méthode ont recommandé son emploi aux expérimentateurs comme moyen d'isoler immédiatement les individus déchargeant un grand nombre de streptocoques dans leur lait. Dans la présente recherche, les résultats obtenus par l'emploi du microscope pour examiner directement les échantillons obtenus de mamelles suspectes ont été soigneusement comparés avec d'autres essais appliqués aux mêmes échantillons de lait pour la recherche de la mammite. Pendant les trois ou quatre dernières années, plusieurs milliers d'échantillons de quartiers ont été étudiés et les résultats comparés à d'autres tests.

On a conclu de ces observations qu'un examen microscopique direct du lait pratiqué immédiatement après la traite peut n'avoir qu'une importance limitée en permettant d'isoler les mamelles infectées du type sous-clinique. Par cette méthode, il est seulement possible d'isoler les individus qui sont infectés d'une façon active. Pour cette raison, un examen microscopique direct du lait frais peut avoir de la valeur comme moyen d'élimination dans un examen initial de toutes les vaches qui sont indiscutablement infectées.

A cet égard, il faut indiquer que, dans la plupart des cas dans lesquels de grandes quantités de streptocoques sont trouvées dans

le lait dès sa sortie de la mamelle, le lait porte d'autres témoignages d'anormalité. En d'autres mots, ce n'est que rarement que le lait fraîchement sorti de la mamelle transporte des streptocoques en suffisamment grand nombre pour qu'on puisse les déceler microscopiquement sans qu'il soit en même temps d'apparence anormale. Des vaches suffisamment infectées pour montrer des streptocoques dans la mamelle en si grand nombre sont généralement infectées d'une façon visible et n'exigent pas la confirmation du laboratoire. D'un autre côté, dans le contrôle régulier du lait, cette méthode est bonne pour déceler les cas dans lesquels les laitiers, consciemment ou inconsciemment, ajoutent du lait anormal à leur fourniture générale.

On a trouvé qu'il y a un grand pourcentage de vaches qui déchargent un petit nombre de streptocoques et qui peuvent servir de foyer d'infection au reste des individus du troupeau. Dans ce cas, le nombre des organismes peut être si limité qu'ils ne peuvent pas être décelés microscopiquement à moins que l'échantillon ne soit mis à l'étuve. En outre, les chiffres peuvent varier de traite à traite. Afin de déceler ces individus, le lait obtenu directement de la mamelle fut gardé à 37° C. pendant une nuit et fut ensuite examiné microscopiquement. Dans cet examen régulier (tableau 10), qui est recommandé par BAKER et BREED (1920) (1), on trouva qu'il était possible par l'étude microscopique d'échantillons mis à l'étuve de déterminer rapidement et d'une façon précise les vaches portant des streptocoques même en petit nombre. En d'autres termes, on a estimé que les vaches qui montrent des streptocoques en longues chaînes dans les échantillons de lait mis à l'étuve portent une infection active. Cette méthode paraît être la plus précise et la plus sûre pour être utilisée dans la recherche de ce type d'animaux.

MÉTHODE DU BLEU DE BROMO-THYMOL POUR LA RECHERCHE DE LA MAMMITE CHRONIQUE. — La méthode employée pour déterminer la présence de mammité sous-clinique par le moyen d'un changement de réaction du lait est très répandue comme méthode rapide utilisée par les propriétaires de troupeaux et les vétérinaires pour déceler des conditions anormales de la mamelle. Cette modification dans la réaction du lait a été déterminée par l'emploi du bleu de bromothymol, du pourpre de bromocrésol, et d'autres indicateurs. Quoique certains préfèrent d'autres indicateurs, l'avis général est que les changements de coloration du bleu de bromothymol sont les plus convenables pour être utilisés dans la recherche de l'alcalinité du lait, condition qu'on a indiquée comme montrant un état anormal de la mamelle.

1) *New-York State Agr. Exp. Sta. Tech. Bul.* n° 80.

TABLEAU 10.

RAPPORT ENTRE LES TYPES DE STREPTOCOQUES DANS DES ÉCHANTILLONS DE LAIT MIS A L'ÉTUVE
ET D'AUTRES TESTS POUR DES QUARTIERS INECTÉS.

TYPES DE STREPTOCOQUES DANS LES ÉCHANTILLONS INCUBÉS	POURCENTAGE DONNANT DES RÉACTIONS POSITIVES								
	Bleu de bromo- thymol	Bol d'essai de traite	Catalase	Moins de 4 o/o de lactose	Strepto- coques sur veau- agar	Colonies alpha ou bêta sur sang- agar	Plus de 2.000.000 de cellules par centi- mètre cube	Sclérose nette à l'autopsie	Plus de 0,14 o/o de chlorures
Longues chaînes.....	21	2	98	60	61	30	51	80	92
Courtes chaînes	4	5	54	16	30	5	16	62	51

CLARK et LUBS (1917) (1) ont noté que les indicateurs sensibles à l'ion hydrogène pourraient être employés pour étudier les modifications du lait. Leurs efforts portèrent sur la détermination de l'acidité du lait consécutive à une croissance bactérienne. VAN SLYKE et BAKER (1919) (2) et BAKER et VAN SLYKE (1919) (3) adoptèrent cette idée et utilisèrent le pourpre de bromocrésol comme indicateur. Ces recherches montrèrent qu'un tel indicateur pouvait être utilisé pour la détection du lait anormal de différents types, tels que le lait contenant de l'acide, des sels acides, du formol, du lait de mamelles malades, du lait additionné d'eau, du lait écrémé, du lait contenant des alcalis, etc. BAKER et BREED (1920) (4) comparèrent les épreuves au bleu de bromothymol, au pourpre de bromocrésol, au rouge phénol et à l'acide rosanique pour la mammite comme l'avait décrite HÖYBERG (1911) (5) et conclurent que la succession des ombres colorées établie par la vue était d'accord avec la succession établie électrométriquement dans tous les cas où la réaction tombait dans les limites du champ sensible connu de l'indicateur. Tous ces indicateurs donnaient des résultats utilisables dans la série des réactions concernant le lait de mamelles infectées, mais le pourpre de bromocrésol fut préféré pour être utilisé d'une façon générale, car il s'appliquait aussi bien au lait plus acide que le lait normal.

GOLDING (1920) (6) étudia aussi le test au pourpre de bromocrésol et prépara ultérieurement un papier au bromocrésol pour être utilisé dans la recherche rapide du lait anormal à l'étable. SHEATHER (1924) (7) déclara que le test n'était pas suffisamment sensible, mais PROCTOR et MATTICK (1926) (8) précisèrent que SHEATHER n'appliquait pas correctement la méthode en ce qui concerne l'âge des échantillons, etc.

RÆDER (1923) (9) et GLOY et BISCHOFF (1929) (10) continuèrent ces recherches en employant du bleu de bromothymol. Comme suite aux études de RÆDER, une maison de fournitures allemande lança l'épreuve sur le marché commercial sous la marque de fabrique de test au « Thybromol ». On obtient actuellement des appareillages analogues dans des maisons de fournitures américaines.

Quoique le bleu de bromothymol soit un indicateur très com-

- (1) *Jour. Bact.*, **2**, 1-45, 109-136, 191-236.
- (2) *New York State Agr. Exp. Sta.*, Tech. Bul. n° 70.
- (3) *New York State Agr. Exp. Sta.*, Tech. Bul. n° 71.
- (4) *New York State Agr. Exp. Sta.*, Tech. Bul. n° 80.
- (5) *Zeit. f. Fleisch-und Milchhygiene*, **21**, 133-147.
- (6) *Journ. Royal Agr. Soc.*, **81**, 168-170.
- (7) *Jour. Comp. Pathology*, **37**, 227.
- (8) *Jour. of. Agr. Science*, **16**, 145-148.
- (9) *Arch. Wissensch. u. prakt. Tierh.*, **58**, 1-53.
- (10) *Zeitschr. f. Fleisch. u. Milchhyg.*, **39**, 113.

mode et rapide pour être utilisé dans la recherche de conditions anormales, il y a certaines limites à son emploi. Une comparaison des résultats obtenus (tableau 11) par l'emploi du bleu de bromothymol et d'autres épreuves utilisables dans la recherche de la mammite sous-clinique sur 500 quartiers, indique que l'essai ne doit pas être considéré comme étant d'une extrême délicatesse. Notre expérience nous a montré que le standard arbitraire du pH 6,8 qui est indiqué par le vert bleuâtre quand le bleu de bromothymol est ajouté, n'est pas le point final voulu à établir pour la recherche de la mammite sous-clinique. Un grand nombre de quartiers donnant une légère réaction (pH 6,8) au bleu de bromothymol ont été trouvés normaux dans toutes les autres épreuves qui furent appliquées au lait obtenu des quartiers soumis à l'examen. D'un autre côté, si le point final de pH 7,0 ou une couleur bleu foncé est pris comme indiquant une condition anormale, des résultats entièrement différents sont obtenus. Tous les quartiers montrant une couleur bleu foncé (planche 1) par l'emploi du bleu de bromothymol furent trouvés anormaux par 3 ou plus des épreuves appliquées au lait obtenu de ces quartiers. Le lait donnant une réaction bleu foncé montra dans chaque cas un excès de chlorures, une diminution de la proportion normale de lactose, et montra une certaine proportion de catalase. 96 % des échantillons donnant une réaction bleu foncé au bleu de bromothymol furent obtenus de quartiers montrant de l'induration ou de la sclérose.

JONES et LITTLE (1933) (1) ont trouvé que de nombreux cas avancés peuvent montrer une acidité prononcée due à la croissance des organismes dans la mamelle.

STABLEFORTH (1930) (2) nota qu'une augmentation de 2 % de matière grasse obscurcissait tellement les lectures du bleu de bromothymol qu'elle rendait les conclusions impossibles. Cette critique est sans aucun doute justifiée si des lectures précises sont à effectuer, car la présence de matière grasse masquera une certaine proportion de la coloration. Cette critique peut être évitée en employant un indicateur suffisamment fort et en n'essayant pas d'utiliser l'épreuve au delà de la précision pour laquelle elle a été prévue à l'origine.

Comme résultat de ces observations, on conclut qu'une coloration bleu foncé avec le bleu de bromothymol (planche 1) indique une condition anormale de la mamelle, tandis qu'une coloration vert bleuâtre (pH 6,8) peut ne pas indiquer un lait définitivement anormal.

EMPLOI DU BOL D'ESSAI DE TRAITE POUR DÉCELER LA MAMMITE CHRONIQUE. — Les personnes qui étudient la mammite ont espéré

(1) *Jour. Dairy Sci.*, **16**, 111.

(2) *Jour. of Comparative Path. and Therap.*, **43**, 22.

TABLEAU 11.

RAPPORT ENTRE LE TEST DU BLEU DE BROMOTHYMOL ET D'AUTRES TESTS POUR LES QUARTIERS INFECTÉS.

RÉACTION DÉTERMINÉE PAR LE BLEU DE BROMOTHYMOL	POURCENTAGE MONTRANT UNE RÉACTION POSITIVE						
	Bol d'es- sai de traite	Plus de 0,14 % de chlorures	Plus de 2.000.000 de cellules par centi- mètre cube	Moins de 4 % de lactose	Pus à l'autopsie	Sclérose à l'auto- psie	Catalase
pH 6,5-6,7	23	42	38	34	16	44	30
pH 6,8-7,4	30	79	50	21	10	70	41
pH 7,0-7,4	98	100	75	100	30	96	100

trouver une méthode rapide et simple qui serait exacte pour le propriétaire de troupeaux et lui permettrait de déceler les mamelles infectées d'une façon régulière à l'étable. C'est pour cette raison que le bol d'essai de traite a été imaginé et est souvent employé dans l'Etat de New-York. Diverses interprétations ont été données aux résultats obtenus par le bol d'essai de traite, de nombreuses personnes croyant que les vaches peuvent être fortement infectées sans montrer de grumeaux dans le bol d'essai, tandis que d'un autre côté, des grumeaux peuvent apparaître alors que la vache est normale.

En comparant (tableau 12) l'utilisation de la méthode du bol d'essai avec diverses autres épreuves pour déceler la mammite, on voit que le bol d'essai a une place très nette dans la recherche de la mammite chronique. On a conclu de l'étude soigneuse de 500 quartiers qu'une réaction nettement positive, c'est-à-dire la présence de flocons dans le bol d'essai, indique vraisemblablement toujours une condition anormale de la mamelle. D'un autre côté, on a trouvé qu'un grand nombre de mamelles infectées pouvaient ne montrer aucune preuve d'infection dans le bol d'essai. On a trouvé que 90% des échantillons de lait donnant une réaction positive au bol d'essai avaient été obtenus de quartiers montrant de l'induration à un degré plus ou moins marqué. D'un autre côté, 84% des échantillons qui ne donnaient aucune trace de condition anormale au bol d'essai furent trouvés provenir de quartiers sclérosés. En outre, près de 70% des échantillons donnant des grumeaux au bol d'essai, montrèrent des streptocoques, tandis que moins de 30% des échantillons ne montrant aucune trace de mammite par l'emploi du bol d'essai contenaient des streptocoques.

L'emploi du bol d'essai est à recommander quand on admet qu'une réaction positive nette indique un état anormal de la mamelle. Toutefois, on ne le recommande pas si le manque de preuve d'infection dans le bol d'essai doit être considéré comme indiquant que l'animal examiné est exempt de toute altération de la mamelle. En d'autres termes, les réactions positives nettes obtenues avec le bol d'essai indiquent une condition anormale de la mamelle, tandis qu'une réaction négative n'établit pas que la mamelle est normale.

L'EXAMEN PHYSIQUE POUR DÉCELER LA MAMMITE CHRONIQUE. —

Il est de pratique habituelle pour les vétérinaires compétents de procéder à un examen physique de la mamelle vide par palpation pour déterminer l'existence de mammite. Cet examen physique peut indiquer la présence de conditions anormales par l'existence de tissus d'induration ou nodulaires dans la mamelle, habituellement appelés sclérose. Si à l'examen physique, on trouve du tissu fibreux ou induré, ceci est considéré par de nombreux vétérinaires comme indiquant de la mammite.

TABLEAU 12.

RAPPORT ENTRE LES RÉSULTATS OBTENUS PAR L'EMPLOI DU BOL D'ESSAI DE TRAITE
ET D'AUTRES ÉPREUVES POUR DÉCELER LES QUARTIERS INFECTÉS.

RÉACTION AU BOL D'ESSAI	POURCENTAGE MONTRANT DES RÉACTIONS POSITIVES							Catalase
	Plus de 0,14 o/o de chlorures	Strepto- coques présents	Plus de 2.000.000 de cellules par centi- mètre cube	Moins de 4 o/o de lactose	Bleu de bromo- thymol	Pus post- mortem	Sclérose à l'autopsie	
Positive	63	66	40	55	50	47	90	68
Négative	67	27	22	23	17	8	84	56

TABLEAU 13.

NOMBRE DE QUARTIERS MONTRANT DE LA SCLÉROSE A L'AUTOPSIE (1)

Post-mortem	Nombre de quartiers	Pourcentage de quartiers	Pourcentage montrant du pus à l'autopsie	Pourcentage montrant des streptocoques dans le lait
Sclérose marquée	298	70	15	37
Sclérose légère	52	12	4	41
Normal	78	18	1 +	1 +

(1) 7 % des vaches n'avaient aucune sclérose dans aucun des quartiers.

Un examen physique de 428 quartiers (tableau 13) indiqua que seulement 18 % étaient normaux à tous égards et ne montraient ni sclérose ni induration, tandis que 70 % en montraient à un degré quelconque. A l'examen *post-mortem*, on trouva, à peu d'exceptions près, que l'examen physique décelait la présence de tissu fibreux. Dans seulement 3 cas, il fut impossible d'obtenir un rapport exact entre l'examen physique et les découvertes faites à l'autopsie. Pour cette raison, on conclut qu'un examen physique pratiqué par un vétérinaire compétent indiquait exactement la présence ou l'absence d'induration.

Une étude ultérieure des quartiers dans lesquels ces tissus anormaux furent trouvés indiqua que 19 % des quartiers qui présentaient tant soit peu de sclérose montrèrent du pus *post-mortem* et 78 % recélaient des streptocoques, ainsi qu'il fut prouvé par culture. D'un autre côté, seulement 1 % des quartiers exempts de sclérose montrèrent du pus à l'examen *post-mortem* et la même vache montra des streptocoques dans des échantillons mis à l'étuve ainsi que d'autres preuves d'infection.

DISCUSSION

Il ressort de la comparaison des diverses méthodes utilisables pour déceler le lait anormal, particulièrement des vaches qui ont de la mammite streptococcique, que l'expérimentateur de laboratoire doit procéder avec circonspection pour interpréter les résultats obtenus par les méthodes habituelles généralement acceptées. Les renseignements présentés indiquent qu'il est possible, pour des vaches, de sécréter du lait normal au point de vue de l'examen microscopique quand on l'examine directement au sortir de la mamelle,

tout en étant déjà une menace pour les autres membres du troupeau au point de vue infectieux. Ceci est particulièrement exact dans les cas où des animaux éliminent des streptocoques par intermittence.

Il est aussi évident que toute vache sécrétant du lait contenant des streptocoques en longues chaînes, ou un nombre excessif de cellules, ou donnant une réaction nette au bleu de bromothymol, est toujours un animal devant être considéré comme une source potentielle de danger pour les autres vaches du troupeau et doit être éliminée ou traitée. En d'autres termes, une réaction positive dans les tests habituels du laboratoire signifie généralement de l'infection, mais une réaction négative peut ne pas nécessairement indiquer que les animaux sont exempts des streptocoques de la mammite.

Puisque la mammite streptococcique est le résultat d'une invasion, par certains types de streptocoques, de la mamelle, il est absolument indispensable, au point de vue du laboratoire, que les méthodes propres à déceler l'agent infectieux soient perfectionnées. Ceci est important parce que l'invasion des streptocoques précède nettement toute modification physique pouvant avoir lieu dans la mamelle. Pour cette raison, une recherche de laboratoire de la mammite devrait être plus délicate et donner des résultats plus constants qu'un examen physique de l'animal, qui dépend d'abord de la recherche des résultats de l'infection, si seulement elle est bien en voie de développement.

Il y a, à présent, certaines difficultés nettes dans l'emploi des méthodes de laboratoire pour étudier la mammite, quand de telles méthodes ne sont employées que comme contrôle. Ces objections sont principalement basées sur la forte proportion de travail nécessaire, comprenant l'obtention d'échantillons individuels et le travail habituel du laboratoire qui doit être poursuivi. D'un autre côté, le contrôle de laboratoire de la mammite se référant au contrôle du lait de consommation a un aspect entièrement différent, car, dans ce cas, la présence de streptocoques en longues chaînes dans le lait de consommation peut, dans la plupart des cas, amener directement à la découverte d'un ou de plusieurs quartiers infectés dans les troupeaux dont le lait est reçu. C'est de cette manière que le contrôle de laboratoire de la mammite devient effectif.

Il est aussi évident que l'étude bactériologique de la flore de la mamelle devrait être accompagnée d'un examen physique des animaux étudiés. En d'autres termes, un examen vétérinaire devrait être effectué pour déterminer la présence de sclérose ou d'induration sur les animaux qui sont employés dans des buts expérimentaux pour étudier, soit la flore normale, soit la flore d'individus infectés. Dans de telles circonstances l'investigateur serait alors capable de déterminer plus ou moins exactement si l'animal dont le lait a été obtenu

Figure IV. — Valeur relative des différents Tests de Laboratoire utilisés pour la détection de la mammite chronique.

a été infecté antérieurement. Si des tissus fibreux ou indurés sont présents, on peut supposer avec raison que la vache n'est pas normale et les résultats obtenus sur les échantillons de lait ne peuvent pas être acceptés comme une peinture fidèle de la flore bactérienne normale de la mamelle. Toutefois, il faut aussi se rappeler qu'un petit pourcentage seulement de mamelles ne montrent pas d'induration. Pour cette raison, les règles précises caractérisant les mamelles « normales » devraient être établies.

Quand les échantillons sont obtenus d'animaux normaux connus, les recherches sur la flore normale de la mamelle devraient jeter plus de lumière sur les bactéries qui sont les hôtes normaux de la mamelle. Les contradictions qui apparaissent dans la littérature tant au point de vue du nombre et des types de bactéries de la mamelle normale peuvent être expliquées par le fait que les vaches dont les échantillons ont été obtenus n'ont pas d'antécédents complètement connus.

Il est certain que dans les cas où les teneurs en sels minéraux et en sucre du lait normal sont étudiées, l'historique de la vache dont le lait a été obtenu devrait être noté, car les renseignements donnés antérieurement indiquent que pendant et après une infection la teneur en sels du lait augmente d'une façon importante et que la teneur en sucre diminue. Il est aussi probable que la teneur en matière grasse est diminuée pendant et après les infections. Toutefois, on n'a pas de renseignements à ce sujet.

Si ces constituants du lait sont tellement modifiés par l'altération du tissu glandulaire de la mamelle, on peut admettre avec certitude que la teneur en caséine doit être modifiée, soit en quantité, soit en qualité. On devrait effectuer sur des échantillons de lait provenant d'animaux ayant des mamelles reconnues saines, des analyses de caséine et d'azote.

Ces commentaires sont particulièrement significatifs à la lumière des renseignements ci-dessus, qui indiquent que dans les districts laitiers ordinaires, un fort pourcentage des animaux a dans ses mamelles du tissu sécréteur anormal. Pour cette raison, il est particulièrement important que l'historique des individus en expérience soit nettement connu et indiqué.

Il est en outre nécessaire que la signification des termes employés pour noter l'infection de la mamelle soit plus claire. Le terme de « mammite » est employé avec des sens différents. La question : « Quand une vache a-t-elle de la mammite ? » peut recevoir plusieurs réponses. Le diagnostic doit-il être basé sur les effets de l'infection, c'est-à-dire sur le tissu fibreux ou cicatriciel, ou sur la présence des agents infectieux, c'est-à-dire des streptocoques ? En d'autres termes, une vache a-t-elle seulement de la mammite, a) quand la

mamelle est indurée, quand des organismes sont présents, ou quand l'inflammation est nette ; ou *b*) quand il n'y a pas d'inflammation, mais quand on trouve des organismes et du tissu cicatriciel ; *c*) quand on ne trouve que du tissu cicatriciel ; ou, enfin *d*) seulement quand des organismes sont présents ?

CONCLUSIONS.

1. 46 % de tous les quartiers étudiés furent trouvés donnant des streptocoques, tandis que 11 % de tous les quartiers examinés montrèrent des poches de pus à l'examen *post-mortem*. Les résultats de l'autopsie indiquent que 21 % des 129 vaches soumises à l'examen *post-mortem* montrèrent du pus dans un ou plusieurs quartiers.

2. Plus de 90 % des animaux examinés montrèrent de la sclérose ou de l'induration du tissu de la mamelle dans un ou plusieurs quartiers.

3. Des épreuves bactériologiques utilisables pour déceler les infections de la mamelle, les suivantes se sont montrées efficaces en ordre décroissant : examen microscopique d'échantillons mis à l'étuve pendant une nuit à 37° C. ; bouillon de veau ; plaques d'agar de Burri ; plaques de bouillon de veau-sang-agar ; et examen direct des échantillons.

4. Quand il y a plus de 500.000 cellules par centimètre cube dans un quartier, cela indique généralement une infection streptococcique de quelque quartier de la mamelle.

5. Le lait contenant plus de 150.000 cellules par centimètre cube indique toujours une condition anormale ou pathologique de la mamelle. Des quantités notables de sclérose peuvent toujours être décelées.

6. Le lait contenant de fortes proportions de cellules continuera généralement à en contenir des nombres exagérés tandis que le lait avec un petit nombre de cellules en montre rarement plus de 200.000 par centimètre cube.

7. La variation dans le taux des cellules par centimètre cube est plus grande dans le lait contenant un grand nombre de cellules que dans le lait en contenant un petit nombre.

8. On n'obtient jamais de réaction alcaline au bleu de bromothymol sur du lait fraîchement traité d'un quartier exempt de sclérose.

9. Quand on trouve des streptocoques dans un lait traité aseptiquement, le quartier est toujours induré.

10. Les quartiers exempts de tissu cicatriciel ou induré ne donnent jamais dans le lait plus de 150.000 streptocoques ou cellules par centimètre cube.

11. Les quartiers indurés ne donnent pas tous des streptocoques ou un nombre significatif de cellules.

12. Le lait d'un quartier normal ou exempt de sclérose ne contient pas plus de 150.000 streptocoques en longues chaînes ou cellules par centimètre cube.

13. Les recherches des proportions de chlorures, de lactose et de catalase existant dans le lait constituent des méthodes très utiles pour déceler les quartiers infectés. Toutefois, les méthodes adoptées pour procéder à ces essais ne sont pas encore telles qu'on puisse les utiliser comme de simples méthodes habituelles.

14. Des observations effectuées en examinant *post-mortem* 129 mamelles, qui avaient été préalablement examinées par palpation, indiquèrent qu'un examen physique ordinaire bien effectué est très efficace pour déceler la sclérose ou l'induration des tissus de la mamelle.

15. Des tests positifs avec le bol d'essai de traite et la réaction au bleu de bromothymol (alcalinité : pH 7,0) indiquèrent toujours un quartier anormal. D'un autre côté, des résultats négatifs n'indiquèrent pas toujours une mamelle normale.

ÉTUDE DE L'APPRÉCIATION DE LA QUALITÉ DES CASÉINES LACTIQUES

par

JEAN PIEN

Ingénieur chimiste I. C. R.

Docteur ès sciences

Directeur des laboratoires des « Fermiers Réunis »

ROBERT MARTIN

et

MARC BERGIER

Ingénieur chimiste I. C. R.

Ingénieur (I. A. N.)

des laboratoires de la laiterie des « Fermiers Réunis »

(Suite.)

§ 3. LA TECHNIQUE DU DOSAGE DES DIFFÉRENTES FORMES D'AZOTE SOLUBLE DANS LES CASÉINES INDUSTRIELLES

I. Les formes d'azote à doser. — Nous avons indiqué, dans notre précédent article, une méthode permettant de déterminer globalement la teneur d'une caillebotte ou d'une caséine en azote soluble dans l'eau.

Ce renseignement peut ne pas être suffisant. En effet : au cours de l'altération fermentaire d'une caillebotte, il peut se former à partir de la protéine pure des produits d'hydrolyse insolubles dans l'eau et ayant échappé, par conséquent, aux déterminations précé-